

富祿靜®膜衣錠 Flurazin F.C® 5mg

藥品成分名：trifluoperazine

藥品外觀：明藍色，圓扁形，錠劑；大小：0.83 公分；標記：[JCP，5]

作用

富祿靜®膜衣錠為口服抗精神病製劑，主要適應症為精神病狀態，噁心嘔吐，攻擊性與破壞性之行為障礙。

用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 劑量應隨個人加以調整，每個患者均應自最低有效劑量開始使用。
3. 如要結束療程，建議在一到兩個星期內逐漸降低劑量，病患切勿自行停藥。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

注意事項

- 1.若您有計畫(已)懷孕、哺乳、肝腎功能不全、心血管疾病、癲間病史之病人，請主動告知您的醫師或藥師。
2. 投與本藥物可能會影響駕駛和機械操作能力，行此類動作時請加以注意。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：不眠、頭暈、便秘，興奮。
2. 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：心臟疾患之惡化，持續高熱，意識障礙等請立即就醫！

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

注意跌倒之預防

服用福祿靜膜衣錠，易造成姿勢性低血壓，暈眩，

椎體外徑作用，例如震顫，肌肉僵直，混亂、感覺遲鈍、姿勢不穩並有經常跌倒等副作用。

服用此藥的期間，需特別注意跌倒的預防，請勿由躺著或坐著突然站立，尤其是初次使用，長期使用病患服用劑量的增加，或是年老之病患。