

※黃疸病脈證并治第十六 371

硝石礬石散方：硝石 礬石 燒，等分

上二味為散，以大麥粥汁和，服方寸匕，日三服。病隨大小便去，小便正黃，大便正黑，是候也。

※黃疸病脈證并治第十六 372

男子黃，小便自利，當與虛勞小建中湯。

〔註〕：

婦人產後經崩，發黃色者，乃脫血之黃色，非黃疸也。今男子黃而小便自利，則知非濕熱發黃也。詢知其人必有失血、亡血之故，以致虛黃之色外現，斯時汗、下、滲利之法，俱不可施，惟當與虛勞失血同治，故以小建中湯調養榮衛，黃自愈矣。

〔集註〕：

高世栻曰：女為陰，男為陽，陰主血，陽主氣，男子黃，陽氣虛也。黃者土之色，陽氣虛而土色外呈。中無濕熱，故小便自利，此為虛也，故當以小建中湯和其陰陽，調其血氣也。本論血痺虛勞篇，有小建中湯主治虛勞，故曰：虛勞小建中，意謂此男子黃而小便利，亦為虛勞之證云爾。（小建中湯方見虛勞中）

※黃疸病脈證并治第十六 373

酒黃疸者，或無熱譫言，小腹滿欲吐，鼻燥。其脈

浮者，先吐之；沉弦者，先下之。

〔註〕：

此詳申酒疸之為病也。酒體濕而性熱，過飲之人必生濕熱為疸病也。無熱，無外熱也；譫語、鼻燥，有內熱也；小腹滿，濕熱畜於膀胱也；

欲吐，濕熱釀於胃中也。其脈浮者，酒熱在經，先吐之以解外也；沉弦者酒飲在裏，先下之以解內也。

〔集註〕：

李紘曰：胃足陽明之脈，起於鼻之交頤中，故鼻燥也。

※黃疸病脈證并治_{第十六 374}

夫病酒黃疸，必小便不利，其候心中熱，足下熱，

是其證也。

〔註〕：

此詳酒疸之病。濕熱生也，必小便不利。其候心中熱，胃府熱也；足下熱，胃經熱也。是其酒疸之證也。

〔集註〕：

程林曰：夫小便利則濕熱行，不利則濕留於胃，胃脈貫膈下足跗，上熏胃脘則心中熱，下注足跗，則足下熱也。

※黃疸病脈證并治_{第十六 375}

酒疸，心中熱，欲吐者，吐之愈。

〔註〕：

此詳申酒疸宜吐之治也。酒疸，心中熱，欲吐者，謂胃中煩亂懊惱欲吐，非吐之不能愈也。

〔集註〕：

程林曰：後證熱深則懊惱欲吐，今微熱則心中熱亦欲吐。病屬上焦，故吐之可愈也。