

肘後備急方

治卒中諸藥毒救解方第六十八

原文

治食野葛已死方。

以物開口，取雞子三枚，和以吞之，須臾吐野葛出。

又方，溫豬脂一升，飲之。

又方，取生鴨就口斷鴨頭，以血瀝口中，入咽則活。若口不可開者，取大竹筒洞節，以頭注其脅，取水竹筒中。數易水，須臾口開，則可得下藥。若人多者，兩脅及臍中各與筒，甚佳。

又方，多飲甘草汁，佳。

姚方，中諸毒藥，及野葛已死方。

新小便和人尿，絞取汁一升，頓服。入腹即活，解諸毒，無過此汁。

中鳩毒已死者。

粉三合，水三升，和飲之。口噤，以竹管強開，灌之。

中射毒。

藍汁，大豆，豬，犬血，並解之。

中野狼毒，毒以藍汁解之。

中野狼葵毒，以葵根汁解之。

中藜蘆毒，以雄黃蔥汁，並可解之。

中躑躅毒，以梔子汁，解之。

中巴豆毒。

黃連，小豆藿汁，大豆汁，並可解之。

中雄黃毒，以防己汁解之。

中蜀椒毒，中蜈蚣毒。

二毒，桑汁煮桑根汁，並解之。

中礬石毒，以大豆汁解之。

中芫花毒，以防風，甘草，桂，並解之。

中半夏毒，以生薑汁，乾薑，並解之。

中附子、烏頭毒，大豆汁，遠志汁，並可解之。

中杏仁毒，以藍子汁，解之。

食金已死者，取雞屎半升，水淋得一升，飲之，日三服。

又方，吞水銀二兩，即裏金出，少者一兩亦足。

姚云，一服一兩，三度服之。扶坐與之，令入腹即活。

又方，鴨血及雞子，亦解之。

今取一種，而兼解眾毒。

取甘草，咀濃煮，多飲其汁，並多食蔥中涕，並佳。

又方，煮大豆，令涌，多飲其汁，無大豆，豉，亦佳。

又方，藍青藍子，亦通解諸毒，常預蓄之。

又方，煮薺，令濃飲一二升，秘方。卒無可煮嚼食之，亦可作散，服之。此藥在諸藥中，諸藥則皆驗。

又方，凡煮此藥汁解毒者，不可熱飲之，諸毒得熱更甚，宜使小冷，為良。

席辯刺史云，嶺南俚人，毒皆因食得之。多不即覺，漸不能食，或更心中漸脹，並背急悶，先寒似瘴。

微覺，即急取一片白銀含之，一宿銀變色，即是藥也。銀青是藍藥，銀黃亦是KT藥，久久者，入眼，眼或青，或黃赤，青是藍藥，黃赤是□藥，俚人有解療者，畏人得知，在外預言三百牛藥，或云三百兩銀藥。余久任，以首領親狎，知其藥常用，俚人不識本草，乃妄言之，其方並如後也。

初得俚人毒藥且令定方。

生薑四兩，甘草三兩，炙，切，以水六升，煮取二升。旦服三服，服訖，然後覓藥療之。

療方。

常山四兩，切，白鹽四錢，以水一斗，漬一宿，以月盡日漬。月一日五更，以土釜煮，勿令奴婢雞犬見，煮取二升。

旦分再服，服了，少時即吐，以銅器貯取。若青色以杖舉五尺不斷者，即藥未盡，二日後更一劑。席辯曾飲酒得藥，月餘始覺，首領梁墳，將土常山，與為呼為一百頭牛藥，服之。即瘥，瘥後二十日，慎毒食，唯有煮飯食之，前後得瘥，凡九人。

又方，黃藤十兩，嶺南皆有，切，以水一斗，煮取二升，分三服，服訖。毒藥內消，若防己儼人藥，常服此藤，縱得自然不發。席云，常服之，利小便，亦療數人。

又方，都淋藤十兩，嶺南皆有，土人悉知，儼人呼為三百兩銀。其葉細長，有三尺微藤，生切，以水一斗，和酒二升，煮取三升，分三服，服訖。毒藥並逐小便出，十日慎毒食，不瘥，更服之，即愈。

又方，乾藍實四兩，白花藤四兩，出州者上，不得取野葛同生者。切，以水七升，酒一升，煮取半升，空腹頓服之。少悶勿怪，單乾藍，搗末，頓服之，亦瘥。

又療腹內諸毒。

都淋藤二兩，長三寸，並細銼，酒三升，合安罌中，密封。以糠火燒四邊，燒令三沸，待冷出，溫服。常令有酒色，亦無所忌，大效。

若不獲已食俚人食者。

先取甘草一寸，炙之，後熟嚼吞之。若食著毒藥即吐，便是得藥。依前法療之，席辯云，常囊貯甘草十片以自防。

註釋

附方 《勝金方》，治一切毒。

以膽子礬，為末。用糯米糊，丸如雞頭實大，以朱砂衣。常以朱砂養之，冷水化一丸，服，立瘥。

《經驗方》，解藥毒上攻如聖散。

露蜂房，甘草等分，用麩炒令黃色，去麩為末，水二碗，煎至八分一碗，令溫。臨臥頓服，明日取下惡物。

《外台秘要》，治諸藥石後，或熱噤多向冷地臥，又不得食諸熱面酒等方。

五加皮二兩，以水四升，煮取二升半，候石發之時，便服。未定，更服。

孫思邈論云，有人中烏頭、巴豆毒。

甘草入腹即定方，稱大豆解百藥毒。嘗試之，不效，乃加甘草為甘豆湯，其效更速。

《梅師方》，蜀椒閉口者有毒，誤食之。便氣欲絕，或下白沫，身體冷。急煎桂汁服之，多飲冷水一二升。忽食飲吐漿，煎濃豉汁服之。

《聖惠方》，治硫黃，忽發氣悶，用羊血服一合，效。

又方，治射 在諸肉中有毒，及漏脯毒。

用貝子末，水調半錢，服效，或食面 毒，亦同用。

《初虞世方》，治藥毒秘效。

巴豆去皮，不出油，馬牙硝，等分。合研成膏，冷水化一彈子許，服，瘥。