

[Clomiphene 50mg/tab 雪蘭芬 錠] - [Clomiphene]

藥師

藥劑部藥師 發佈日期

2011/10/10

<藥物效用>

不孕症用藥

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.一般用法:自月經來潮第五天開始服藥，連服五天
- 2.已懷孕的婦女不建議使用。

<其他注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物〈包含處方藥、非處方藥及中藥〉。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：
卵巢肥大、囊腫、潮紅、腹痛、失眠
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

<藥品外觀>

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.80 公分；標記：[S]

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。