

小柴胡湯

治傷寒五、六日，寒熱往來，胸脅苦滿，嘿嘿不欲

飲食，心煩喜嘔，口苦耳聾，脈弦數者，此是少陽經

半表半裡之證，宜此湯以和解之。

柴胡 半斤 黃芩 三兩 人參 三兩 半夏 半升 甘草 炙，三兩 生薑

切，三兩 大棗 擘，十二枚。上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓再煎，

取三升，溫服一升，日三服。

- (1)若胸中煩而不嘔，去半夏、人參，加枳實。
- (2)若渴者，去半夏加人參、枳實。
- (3)若腹中痛，去黃芩加芍藥。
- (4)若脅下痞硬，去大棗加牡蠣。
- (5)若心下悸，小便不利者，去黃芩加茯苓。
- (6)若不渴外有微熱者，去人參加桂枝，溫覆取微似汗癒。
- (7)若咳者，去人參、大棗、生薑，加五味子、乾薑。

〔集註〕：

程應旂曰：方以小柴胡名者，取配乎少陽之義也。至於制方之旨及加減法，則所云上焦得通，津液得下，胃氣因和盡之矣。何則？少陽脈循脅肋，在腹陽背陰兩岐間，在表之邪欲入裡，為裡氣所拒，故寒往而熱來。表裡相拒而留於岐分，故胸脅苦滿。神識以拒而昏困，故嘿嘿。木受邪則妨土，故不欲食。膽為陽木而居清道，為邪所鬱，火無從泄，逼炎心分，故心煩。清氣鬱而濁，則成痰滯，故喜嘔，嘔則木火兩舒，故喜之也。此則少陽定有之證，其餘或之云者，以少陽在人身為遊部，凡表裡經絡之罅，皆能隨其虛而見之，不定之邪也。

據證俱是太陽經中所有者，特以五、六日上見，故屬之少陽，半表半裡兼而有之，方是小柴胡證。方中以柴胡疏木，使半表之邪得從外宣，

黃芩清火，使半裡之邪得從內徹。半夏豁痰飲，降裡氣之逆。人參補久虛，助生發之氣。甘草佐柴、芩調和內外，薑、棗佐參、夏通達營衛，相須相濟，使邪無內向而外解也。至若煩而不嘔者，火成燥實而逼胸，故去人參、半夏加栝蒌實也。渴者，燥已耗液而逼肺，故去半夏加栝蒌根也。腹中痛，木氣散入土中，胃陽受困，故去黃芩以安土，加白芍以戢木也。脅下痞硬者，邪既留則木氣實，故去大棗之甘而泥，加牡蠣之鹹而軟也。心下悸，小便不利者，水邪侵乎心矣，故去黃芩之苦而伐，加茯苓之淡而滲也。不渴身肌有微熱者，半表之寒尚滯於肌，故去人參加桂枝以解之也。咳者，半表之寒湊入於肺，故去參、棗加五味子，易生薑為乾薑以溫之；雖肺寒不減黃芩，恐乾薑助熱也。總之，邪在少陽，是表寒裡熱，兩鬱不得升之，故小柴胡之治，所謂升降浮沉則順之也。

※刪補名醫方論卷八-方劑 154

大柴胡湯

治熱結在內，心下急嘔不止，鬱鬱微煩，柴胡證仍

在者，與大柴胡湯下之。

柴胡 半斤 黃芩 三兩 半夏 半升 芍藥 三兩 枳實 四枚 大黃 二兩

生薑 五兩 大棗 擘，十二枚。上八味，以水一斗二升，煮取六升，去滓

再煎，溫服一升，日三服。

〔註〕：

柴胡證在，又復有裡，故立少陽兩解法也。以小柴胡湯加枳實、芍藥者，仍解其外以和其內也。去參、草者，以裡不虛。稍加大黃，以瀉結熱。倍生薑者，因嘔不止也。斯方也，柴胡得生薑之倍，解半表之功捷，枳、芍得大黃之少，攻半裡之效徐，雖云下之，亦下中之和劑也。

※刪補名醫方論卷八-方劑 155

柴胡桂枝湯

傷寒六、七日，發熱微惡寒，肢節煩疼微嘔，心下

支結，此太陽少陽併病也，柴胡桂枝湯主之。

柴胡 四兩 桂枝 一兩半 人參 一兩半 甘草 一兩 半夏 洗，二合半 黃

芩 一兩半 芍藥 一兩半 大棗 擘，六枚 生薑 切，一兩半。上九味，以水七

升，煮取三升，去滓，分溫服。

〔集註〕：

柯琴曰：仲景書中最重柴、桂二方，以桂枝解太陽肌表，又可以調諸經之肌表；小柴胡解少陽半表，亦可以和三陽之半表。故於六經病外，獨有桂枝證，柴胡證之稱，見二方之任重不拘於經也。如陽浮陰弱條，是仲景自為桂枝證之注釋；血弱氣虛條，是仲景自為柴胡證之注釋。桂枝有壞病，柴胡亦有壞病，桂枝有疑似證。柴胡亦有疑似證。病如桂枝證而實非，若腳攣急與胸中痞硬者是已。病如柴胡證而實非，本渴而飲水嘔食穀嘔，與但欲嘔胸中痛微澹者是已。此條為傷寒六七日，正寒熱當退之時，反見發熱惡寒諸表證，更見心下支結諸裡證，表裡不解，法當表裡雙解之。然惡寒微，發熱亦微，可知肢節煩疼，則一身骨節不疼；可知微嘔，心下亦微結，故謂之支結。表證雖不去而已輕，裡證雖已見而未甚。故取桂枝之半，以散太陽未盡之邪；取柴胡之半，以解少陽微結之證。口不渴，身有微熱者，法當去人參；以六、七日來，邪雖未解，而正已虛，故仍用之。外證雖在，而病機已見於裡，故方以柴胡冠桂枝之上，為雙解兩陽之輕劑也。