

登革熱防治



登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，是一種藉由病媒蚊叮咬而感染的急性傳染病，主要呈現發燒、出疹、肌肉骨骼疼痛等症狀，依抗原性可分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型，合併感染可能造成出血性登革熱。

登革熱的傳染途徑：登革熱病患於發病前一天至發病後第五天，血液中存在有登革病毒（此時期稱為病毒血症期），此時若被斑蚊叮咬，斑蚊因此感染病毒，而病毒在蚊蟲體內增殖 8-12 天後，病毒就會至病媒蚊的唾液腺，當它再叮咬其他健康人時，就將病毒傳出，這隻斑蚊終生均具有傳播病毒的能力。

臨床症狀：若有發燒、頭痛、全身倦怠、後眼窩痛、骨頭肌肉痠痛或關節痠痛等症狀，請迅速就醫，並將旅遊史或活動史一併告知醫師，以利診療。

經醫師診斷登革熱應注意事項：

1. 遵照醫師指示服藥、休息、多喝水。
2. 自您發病後五日內，應注意避免被蚊蟲叮咬，而將病毒藉由蚊蟲散播出去。
3. 建議防蚊措施
 - （1）家中裝設紗窗紗門
 - （2）著淺色長袖衣褲
 - （3）睡覺時掛蚊帳

(4) 使用捕蚊燈（蚊香僅具驅蚊效果）

(5) 必要時塗抹防蚊藥劑

(6) 生病時期間儘量在家休息

隨手清容器 了了不孳生

登革熱bye bye



1 儲水桶倒置或加蓋
2 清洗水生植物容器
3 疏通屋簷排水溝
4 馬槽水定期更換
5 清除花盆底盤
6 保持旗座乾燥
7 定期刷洗底盤
(如飲水機、冰箱、茶具)

1 打掃用具倒置
2 清除瓶罐空盒
3 欄杆不留凹槽
4 水池飼養食蚊魚
5 廢輪胎打洞
6 疏通排水溝
7 遊樂器材保持乾燥
8 定期清洗冷卻水塔
9 樹洞填土或種花
10 帆布鋪平不積水

若有發燒、頭痛、肌肉關節痛、
出疹等疑似登革熱症狀，儘速就醫。

巡 經常巡檢，
避免戶外積水。

倒 清除積水，
必要的容器倒置。

清 容器減量，
清除不要的器物。

刷 刷洗容器，
避免蟲卵再附著。

衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

www.cdc.gov.tw

1922防疫達人
www.facebook.com/TWDCDC

疫情通報及關懷專線：1922
2013.07 廣告