

[Urogen 50mg/tab 抑炎源 錠] - [Phenazopyridine @]

藥師

藥劑部藥師 發佈日期

2011/10/10

<藥物效用>

緩解泌尿道發炎引起之疼痛

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.尿液或隱形眼鏡可能會呈橘紅色，此為正常現象
- 2.蠶豆症患者請先與醫師充分討論後再使用此藥。

<其他注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物〈包含處方藥、非處方藥及中藥〉。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：
腸胃不適、頭痛、過敏、搔癢
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

<藥品外觀>

深褐色，圓形，雙凸錠劑，大小:0.8cm

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。