

<藥物效用>

治療甲狀腺機能亢進。

<服藥指示>

1. 請按照醫師指示服藥，不可擅自停藥。
2. 請於每天同一時間、固定於飯前或飯後服藥，以達到最好的藥效。
3. 忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。

<注意事項>

1. 若對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。
2. 若您服用此藥期間有懷孕或哺乳的計畫，請主動告知您的醫師。
3. 若您患有肝臟方面的疾病，或是您正在服用抗凝血劑、鉀離子補充劑或阻斷劑、強心配糖體等，請主動告知您的醫師。
4. 請保存在室溫下，陰涼乾燥之處，避免光線照射。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，若有下列情形，請勿驚慌：頭痛、腸胃不適等，此症狀可隨時間慢慢減弱。
2. 若上述症狀加重或出現以下情形，請立即與醫師聯絡：發燒、畏寒、皮膚紅腫或搔癢、皮膚或眼球變黃、異常疲倦、咳嗽、喉嚨痛、關節疼痛、瘀青、血尿、血便、月經週期改變等情形，請立即與醫師聯絡。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。