

<藥物效用>

治療惡性腫瘤之蝕骨性骨頭轉移、惡性高血鈣症。

<服藥指示>

1. 請依照醫師指示服藥。
2. 忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。
3. 此藥建議於早餐飯前一小時服用。

<注意事項>

1. 此藥主要由腎臟排除，因此治療期間需補充足夠的水分。
2. 此藥應避免與牛奶、含鈣食物、制酸劑、鐵劑或其他藥物併服，因會阻礙 Bonfos 體內的吸收。
3. 服用此藥前，若您有以下情形，請先告知您的醫師：孕婦或授乳婦女、腎功能不良、正在服用的藥物或成藥，尤其是非類固醇類止痛消炎藥(如：Diclofenac)、胺基配醣體類抗生素(如：Aminoglycosides)。
4. 治療期間，若您需做牙科手術，請先告知您的醫師正在服用此藥。
5. 若對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。

<副作用>

每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：胃腸不適、輕微低血鈣症狀。這些症狀會隨時間慢慢減弱，若情況未改善或惡化，請與醫師連絡。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。