

#### <藥物效用>

肌肉鬆弛。

緩解肌肉疼痛或僵硬。

#### <服藥指示>

- 1.請按照醫師指示服藥。
2. 忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。

#### <注意事項>

- 1.孕婦或授乳婦女請告知您的醫師或藥師。
- 2.若對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。
- 3.請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物（包含非處方藥），特別是抗組織胺的藥物。
- 4.此藥品可能導致嗜睡，服藥後不宜開車或操作危險機械。
- 5.酒精會加重的嗜睡作用，服用此藥期間請避免飲酒。
- 6.服藥期間，尿液有時會變成橘色或紅紫色，這是屬於正常現象。請勿驚慌。

#### <副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：頭暈、腸胃不適、畏光、虛弱，若情況未改善或惡化，請與醫師連絡。
- 2.若上述症狀加重或出現以下情形，請立即與醫師聯絡：皮膚或眼睛變黃、皮膚起疹子或搔癢、胃部疼痛情形。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。