

※婦人雜病脈證并治 第二十二 514

帶下經水不利，少腹滿痛，經一月再見者，土瓜根

散主之。

〔按〕：

「再」字當是「不」字，若是「再」字，一月兩來，與上文不利不合，是傳寫之訛。

〔註〕：

此亦前條在下未多，經候不勻之證。帶下，胞中病也。胞中有宿瘀，從氣分或寒化，則為白帶；從血分或熱化，則為赤帶；從氣血寒熱錯雜之化，則為雜色之帶也。若兼經水不利，少腹滿痛，乃有瘀血故也。其經至期不見，主以土瓜根散者，土瓜能逐瘀血，蟪蟲能開血閉，桂枝芍藥舒陽益陰，通和榮氣，則瘀去血和，經調帶止矣。

※婦人雜病脈證并治 第二十二 515

土瓜根散方：土瓜根 芍藥 桂枝 蟪蟲 各三分

上四味，杵為散，酒服方寸匕，日三服。

※婦人雜病脈證并治 第二十二 516

寸口脈弦而大，弦則為減，大則為芤；減則為寒，

芤則為虛，寒虛相搏，此名曰革。婦人則半產漏下，

旋覆花湯主之。

〔按〕：

此條詳在傷寒論辨脈法篇，錯簡在此。旋覆花湯主之一句，亦必是錯簡。半產漏下，則氣已下陷，焉有再用旋覆下氣之理。

※婦人雜病脈證并治第二十二 517

旋覆花湯方：旋覆花 三兩 蔥 十四莖 新絳 少許

上三味，以水三升，煮取一升，頓服之。

※婦人雜病脈證并治第二十二 518

婦人陷經漏下，黑不解，膠薑湯主之。

〔註〕：

陷經者，謂經血下陷，即今之漏下崩中病也。黑不解不成文，膠薑湯方亦缺。

〔集註〕：

李杲曰：陷經漏下，謂經脈下陷，而血漏下不止，乃氣不攝血也。黑不解者，瘀血不去，則新血不生，榮氣腐敗也。然氣血喜溫惡寒，用膠薑湯溫養氣血，則氣盛血充，推陳致新，而經自調矣。

〔按〕：

此條文義，必有缺誤，姑採此註，以見大意。

※婦人雜病脈證并治第二十二 519

婦人少腹滿如敦狀，小便微難而不渴，生後者，此

為水與血俱結在血室也，大黃甘遂湯主之。

〔註〕：

敦，大也。少腹，胞之室也。胞為血海，有滿大之狀，是血畜也。若小便微難而不渴者，水亦畜也。此病若在生育之後，則為水與血俱結在血室也。主之大黃甘遂湯，是水血並攻之法也。