

急性腹痛莫輕忽，延誤就醫

可能導致敗血症或腹內膿瘍破裂

長年在大陸天津經商的謝先生，47歲的他除了痛風及高血壓外，並無其他慢性疾病。有天，腹部突然發生急劇疼痛，他以爲是腸胃炎，就在當地醫院拿了點藥，隔天因疼痛未消，再度就診，醫生說是胰臟炎，就開了藥讓他回家休養。一星期後，肚子依然悶痛，且每晚都有寒顫、發燒的現象，他便回臺灣就診。

在本院急診時，已出現腹膜炎症狀，白血球計數高達2萬多，且發炎指數更達20（CRP正常值是小於0.5），腹部電腦斷層檢查更發現他肚子裡膿



傳統闌尾炎開刀傷口

瘍的面積不小。急診緊急照會外科蘇智銘醫師，診斷其爲急性闌尾炎破裂併發膿瘍，經手術治療，一星期後安然出院，門診追蹤也沒問題，現已返回天津工作。

蘇醫師指出，急性腹痛的原因很多，但需緊急開刀的情況有急性闌尾炎（盲腸炎）、消化性潰瘍破裂及腸穿孔等，其中急性闌尾炎爲最常見。本院現今對急性闌尾炎開刀都以「微創腹腔鏡手術」爲主，其有傷口小、住院天數短的優點，並不另外收取自費費用。



腹腔鏡闌尾切除開刀傷口，有三個幾乎看不到傷口

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行爲，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。