

白若霜，她，雙十年華的電影紅星，雖然給人一種高深莫測，冷如冰霜的印象，但是她的歌喉、演技及嚴謹的私生活，博得很多人的讚賞。有夜，從攝影棚錄影結束，搭車回家後，突然發生急劇的腹痛且伴有頭痛、噁心、嘔吐。她母親送她到附近的診所，醫生診察時她有些發燒，右下腹疼痛及腫脹，經初步診斷為急性盲腸炎有轉變為腹膜炎的可能。她被送到開放醫院緊急開刀，發現盲腸並沒有什麼病變，反而在輸卵管有發炎的跡象，無疑的她患了淋病性輸卵管炎。但她無法相信，因為僅有一次讓她的男友超越愛撫的範圍。雖然盤尼西林（penicillin）可以殺死淋病雙球菌，但由於發現太晚，她的輸卵管已有疤痕組織的形成，醫生告訴她將來也許不能再生育了。躺在病床上，她非常的懊喪，因為僅經過一度的纏綿，深懼會懷孕而影響票房記錄；還好，這以後仍有月經，心中的疑慮減輕不少，卻從來未想到會感染性病而有如此可怕的後果！

性病

性病

文：陳祝芳 圖：何信重



緒言 性病 通；對 部重 而淋 炎；在 如上 代的 的羅 是淋 447. 主要 但病 觸後 在。 而對 愈來



②避孕藥的迅速發展，使大部分的男不再使用保險套，或許正因如此使已婚及未婚的婦女發生性行為的頻率增加，而且避孕藥使陰道的濕度增加，造成一個鹼性的環境，更使淋菌易於生長傳播。

③淋菌對某些藥物產生抗藥性，在治療的過程上增加甚多的困擾。（目前已有淋菌對Penicillin產生抗藥性的報告）。

目前國內由於工商業發達，各種“特種”營業應運而生，助長性病的傳播；但是很多人皆在私人開業診所治療及患者諱疾忌醫等原因，無法獲得正確的統計數字，不過由台北市性病防治所發表的資料看來，性病患者的年齡有逐漸降低的趨勢，且學生的罹患率也逐漸升高。筆者為瞭解一般知識水準較高的民衆，對性病認識的程度，因此由「健康世界」雜誌七月號“你有多少性病知識”中選取數道題目，加上筆者參考其它書籍編成一份問卷。由於技術上的困難，加上一般人對性病的偏見，我們無法說服患者來答問卷，因此只能依調查的方便，選擇四個團體作為問卷的對象。一是大學男生組共42人。二是大學女生組39人，兩組主要來自“救國團張老師”及參加暑期活動之各大專院校學生，以及榮總復健部的職員。三是護生組30人，主要由仁愛醫院實習的護校二、三年級學生所回答。四是中學組共36人。主要是醫院門診患者及在紙業公司上班的職員所回答；他們大都是高初中程度的男性。因為抽樣問卷的對象很複雜，因此筆者無意以所得的結果，來代表大學生或護生或中學程度民衆，對性病的認識深度，而只是讓大家了解社會上某些人對這些問題有何種看法而已。以下是問卷的內容及統計結果，加上筆者個人的一些意見。

緒言

性病的種類大約可分為五種，其中以淋病和梅毒最普遍；對健康的影響也最嚴重。就梅毒而言，可造成身體內部重要器官如腦、心臟、主動脈、肝和腎等的嚴重損害，而淋病在男性可造成前列腺、輸精管、副睪、關節等的發炎；在女性則引起輸卵管、骨盤腹膜、關節的發炎，甚至如上述的紅星造成不孕症。不但如此，更可以傳染給下一代的子女，嚴重地影響到他們的終生幸福。自從1943年penicillin應用於性病的治療後，在美國每十萬人口中梅毒的罹患率由1943年的447人到1975年減至39.3人，可是淋病的感染率卻由1958年的129.3人至1975年的447.7人，增加達3.5倍之多！造成淋病如此氾濫的原因主要有下列幾點：

①女性感染淋病差不多80%沒有明顯的初期症狀，但病菌卻在他們體內潛伏而成爲帶菌者，當男性和他們接觸後，即將淋菌傳給男性而發病，可是他們本身卻逍遙自在。由於這種「沉默的帶菌者」不會主動的求醫診治，因而對於女性患淋病的管制工作無從進行，以致淋病的流行愈來愈嚴重、廣泛。

問卷內容

3. 您認為梅毒早期發現的最佳方法是：

- (a) 定期 X 光檢查。
 (b) 定期抽血檢查。
 (c) 定期尿液檢查。
 (d) 不知道。

1. 梅毒和淋病是如何傳給人的？

- (a) 吸入梅毒、淋病患者所吐的飛沫，經呼吸道感染。
 (b) 食用蚊蠅沾過之不潔東西而感染。
 (c) 主要是和患者發生性行為而感染。

組別 答案	大男	組大女	組護生	組中學
a	0	0	0	0
b	0	0	0	0
c	42(100%)	39(100%)	30(100%)	35(97.2%)
計	42	39	30	36

一般而言，大家幾乎都知道性病絕大多數是由於和患者發生性行為而感染，其它如接吻，公共浴室的毛巾，浴盆，茶杯等雖也有被傳染的可能但為數不多。因此為了防止被此種傳染病所感染，最好是避免尋花問柳。

2. 淋病和梅毒的傳染方式是：

- (a) 由男到女或由女到男。
 (b) 由男到男或由女到女。
 (c) 以上二者皆可。
 (d) 不知道。

組別 答案	大男	組大女	組護生	組中學
a	3(7.1%)	9(23.1%)	9(30%)	21(58.3%)
b	0	0	1(3.3%)	0
c	39(92.9%)	30(76.9%)	20(66.7%)	15(41.7%)
d	0	0	0	0
計	42	39	30	36

本題答(a)者各組分別是大男組 7.1%，大女組 23.1%，護生組 30%，中學組 58.3%。或許一般人認為性病一定要男到女或女到男才會傳染。但目前同性戀的增加，性病同樣也可傳染給做愛的對象。本題大學男生答的最好，可能因一般大學男生對於「性」方面的問題，始終有較高的興趣，常常以此當聊天的話題；女生是否如此筆者無從獲知。

組別 答案	大男	組大女	組護生	組中學
a	0	0	0	0
b	36(85.7%)	34(87.2%)	24(80%)	31(86.1%)
c	5(11.9%)	3(7.7%)	4(13.3%)	4(11.1%)
d	1(2.4%)	2(5.1%)	2(6.7%)	1(2.8%)
計	42	39	30	36

通常淋病才作尿道分泌物的檢查，而梅毒早期發現主要還是靠定期抽血檢查。本題沒有人答靠 X 光檢查，不過各組約有 10% 左右的人答靠尿液檢查。

4. 性病是很可怕的傳染病，近代醫學發達，各種檢查

- 、抗生素皆有重大發展，所以性病患者的數目：
 (a) 急劇減少。
 (b) 仍然很多。
 (c) 已經接近滅絕。

組別 答案	大男	組大女	組護生	組中學
a	8(19.0%)	14(35.9%)	11(36.7%)	9(25%)
b	33(78.6%)	25(64.1%)	19(63.3%)	24(66.7%)
c	1(2.4%)	0	0	3(8.3%)
計	42	39	30	36

本題選(a)者在大男組為 19.0%，大女組 35.9%，護生組 36.3%，中學組 25.1%。尤其女性的兩組皆在 35% 以上，或許是女生平時較不喜歡談論此類話題，或是認為此病一般人都覺得不太名譽，患者應該很少才對。但是目前由於工商發達，社會繁榮，雖然性病防治所對妓女及北投的侍應生常做定期檢查，使他們的感染率年年降低，但社會上還有很多其它特種營業人員無法集中管理，性病還是不易控制。

5. 假如您不幸得到性病，您將？

- (a) 到附近藥房購買成藥服用。
 (b) 根據報上、廣播的宣傳，至那些診所檢查治療。
 (c) 至性病防治中心接受檢查治療。

(d)基於羞恥，都不治療，任其自然發展。

組別 答案	大男	大女	組護生	中學組
a	0	0	0	0
b	0	2(5.1%)	0	0
c	42(100%)	37(94.9%)	30(100%)	36(100%)
d	0	0	0	0
計	42	39	30	36

本題在大學女生有2人答根據廣告至那些診所治療，其餘皆100%至性病防治中心接受檢查。但筆者個人認為本問卷所調查的對象幾乎皆不是患者，若真正得病常常基於各種心理因素，他們是否真正到防治中心求治還是很難預料。或許學生基於經濟因素無法在外就醫，加以較高的醫學常識，近年來學生到防治中心就診比率有提高的趨勢，但要真正達到理想的就診率實在很困難，因為很多民衆總有性病是不太光榮的觀念，加上每天受報紙大量包醫廣告的影響，還是有很多人不自願到防治中心去。筆者曾在延平北路某特種營業區發現附近有關於治性病的診所大大小小不下30處，若包括招牌上寫專責治性病特效藥的藥房可能多達五、六十處。

6. 如果梅毒初期病灶一硬性下疳結節，沒有接受治療而自然消失，您認為這個人的情形如何？

- (a)已經完全治癒，不須再治療，但那要定期檢查。
(b)由於梅毒病菌已潛伏至其它的器官，所以必須治療。

(c)表示病情相當嚴重，醫藥無效。

組別 答案	大男	大女	組護生	中學組
a	1(2.4%)	3(7.7%)	5(16.6%)	0
b	40(95.2%)	35(89.7%)	25(83.4%)	36(100%)
c	1(2.4%)	1(2.6%)	0	0
計	42	39	30	36

本題答(a)者在護生組16.6%，大男組2.4%，大女組7.7%。或許是護生缺少至性病防治所實習的機會。相當不錯的是很少人認為病情嚴重，醫院無效。

7. 假若(最好不要如此)和配偶以外的人發生性關係，您將採取下列那些方法以防中彩(多選)？

- (a)完全不做任何預防措施。

- (b)若對方脫光衣服，在陰部有潰瘍或身上有紅斑，或局部淋巴腫大，您將拒絕和他(她)發生關係。

- (c)使用保險套。
(d)事前吃藥。
(e)事後用肥皂及溫水局部沖洗。
(f)事後時常抽血檢查。

組別 答案	大男	大女	組護生	中學組
a	0	0	0	2(5.6%)
b	34(81.0%)	35(89.8%)	20(66.6%)	18(50%)
c	21(50.0%)	17(43.6%)	9(30%)	16(44.4%)
d	14(33.3%)	16(41.0%)	10(33%)	8(12.2%)
e	15(35.7%)	22(56.4%)	12(40%)	2(5.6%)
f	27(64.3%)	23(59.0%)	18(60%)	6(16.7%)

本題為多選，只要有選的皆列入統計。本題選(b)者在各組皆佔第一位。而事後常抽血檢查在大學男女生及護生組佔第二位。中學組以使用保險套作第二位。大學男生則用保險套佔第三，而女生皆選事後用肥皂及溫水局部沖洗佔第三。事實上此法對預防性病相當有效，日本有一藝妓每次接客後，馬上爬起來沖洗，結果使她從事此種工作二十年也從未得過性病，堪稱此業之模範！

8. 您認為

- (a)淋病患者不會同時得到梅毒。
(b)梅毒患者一定不會再有淋病。
(c)淋病和梅毒可同時或不同時感染同一個人。
(d)不知道。

組別 答案	大男	大女	組護生	中學組
a	0	2(5.1%)	1(3.3%)	5(13.9%)
b	0	0	1(3.3%)	0
c	38(90.5%)	32(82.1%)	25(83.4%)	31(86.1%)
d	4(9.5%)	5(12.8%)	3(10%)	0
計	42	39	30	36

因為淋病和梅毒的傳染皆由性交而來，這二種病常集中同一個人的身上，致使十八世紀以前的學者認為二者是同一疾病的二種表現。John Hunter 以為淋病生在黏膜上面梅毒下疳發生在皮膚上，根據此種假設，將淋病患者

的膿液移到自己身上，結果長出梅毒下疳，顯然他擷取材料的病人同時有梅毒，這是一件純屬巧合之事，卻使人們對於「淋病和梅毒是否為同一疾病」疑難的研究延後了半世紀。現在大部分的人都知道梅毒和淋病可同時或不同時發生在同一個人的身上。

9. 淋病接受治療痊癒後：

- (a) 終生具有免疫力，不會再受到感染。
- (b) 短時間內具有免疫力。
- (c) 隨時可能再受到傳染。

組別 答案	大男	組大男	女組	護女	生女	組中	學組
a	1 (2.4%)	1 (2.6%)	3 (10%)	1 (2.8%)			
b	8 (19.0%)	13 (33.3%)	0	9 (25.2%)			
c	33 (78.6%)	25 (64.1%)	27 (90%)	26 (72%)			
計	42	39	30	36			

或許有些人以為淋病像其它傳染病一樣，具有某種程度的免疫力，因此回答終生或短期有免疫力者除護生組外，各組還是有 20 % 以上。

10. 您認為梅毒：

- (a) 為一種可遺傳的疾病。
- (b) 為一種傳染的疾病。
- (c) 既可遺傳又可傳染的疾病。

組別 答案	大男	組大男	女組	護女	生女	組中	學組
a	1 (2.4%)	1 (2.6%)	0	2 (5.6%)			
b	14 (33.3%)	10 (25.6%)	14 (46.7%)	2 (5.6%)			
c	27 (64.3%)	28 (71.8%)	16 (53.3%)	32 (88.8%)			
計	42	39	30	36			

孕婦如感染梅毒，在懷孕的三個月半至四個月半時，梅毒螺旋菌即可由母親的血液經過胎盤，臍帶而傳染給胎兒，結果常引起流產、早產、死產等後果。即使能夠幸運生產，也很可能會產下先天性梅毒，因此孕婦在懷孕初期做一、二次血清檢驗是絕對必要的。因為遺傳基因沒有改變、所以梅毒經完全治療後還是可以生育的，所以不是遺傳的疾病，或許受「先天性梅毒」這個名詞的影響，護生組有 53.3 %，大男組有 66.7 %，大女組有 74.4 %，中學組有 94.4 % 選可遺傳，或許我們對這點必須加強宣傳，使大眾對性病有更深的認識。

11. 女性感染淋病而不治療，會產生什麼後果？(多選)

- (a) 停止月經。
- (b) 性生活失常。
- (c) 不孕症。
- (d) 關節炎。

組別 答案	大男	組大男	女組	護女	生女	組中	學組
a	0	2 (5.2%)	0	2 (5.6%)			
b	4 (9.6%)	5 (12.8%)	3 (10%)	4 (11.1%)			
c	9 (21.4%)	13 (33.3%)	7 (23.3%)	22 (61.1%)			
d	1 (2.4%)	1 (2.6%)	2 (6.7%)	2 (5.6%)			
cd	15 (35.6%)	10 (25.6%)	4 (13.3%)	3 (8.3%)			
bc	13 (31.0%)	8 (20.5%)	14 (46.7%)	3 (8.3%)			

淋病不易控制的原因，如前所述有 80 % 以上的女性患者毫無初期症狀，等到轉變為慢性時，造成各種併發症如關節炎、心內膜炎、淋性輸卵管炎、直腸炎，甚至卵巢腫脹而導至不孕症。本題回答知道可能造成不孕症各組大都在 80 % 左右，但知道會發生關節炎者在大男組 38 %，大女組 28.2 %，護生組 19.9 %，中學者 13.9 %，或許近年來抗生素的廣泛使用，由淋菌造成的關節炎已經很少了。

12. 您認為梅毒除了經由性交感染外，尚可由下列何種途徑感染？

- (a) 接吻。
- (b) 輸血。
- (c) 皮膚破損處。
- (d) 以上均可。

組別 答案	大男	組大男	女組	護女	生女	組中	學組
a	1 (2.4%)	3 (7.7%)	2 (6.6%)	5 (13.9%)			
b	12 (28.6%)	7 (18.0%)	1 (3.3%)	7 (19.4%)			
c	1 (2.4%)	5 (12.8%)	1 (3.3%)	2 (5.6%)			
d	28 (66.6%)	24 (61.5%)	26 (86.8%)	22 (61.1%)			
計	42	39	30	36			

由上面的統計可見選以上皆可者除護生者 86.8 %，外其餘各組皆在 60 % 左右。筆者認為醫院中肝炎患者相當多，因此護生有機會由師長處知道輸血、皮膚破損處皆可傳染病菌，再加上本身具備不少傳染病的知識，所以護生回答的最好。



結語

以上關於性病的一般常識討論很多，至於性病的流行其主要的因素是在於社會、經濟、文化、教育等各種非醫學方面的弊端所促成，甚至人口的集中都市、人口的迅速流動，觀光事業的發達，結婚年齡的延遲也都是造成性病流行的主要原因。「一般民衆對於性病都認為是一種不名譽的疾病」，這觀念對於尋花問柳者或有少許嚇止作用，但是很多患者因此不願意讓別人知道，甚至父母妻子都被隱瞞，這種諱疾忌醫的觀念，使性病在暗地裏更容易蔓延。因此性病的防治要獲得良好的效果，必須要多方面的配合，由改善社會奢侈浮華的風氣，提高國民的道德水準，普遍教育民衆性病防治常識，使其了解男女的生殖器官也是身體的一部分，並無特別神秘之處，有病狀一定找可靠的醫生作徹底的治療，否則不僅危害自己的健康，還禍及妻子兒女的幸福。

(多選)

組	
6%)	
.1%)	
.1%)	
6%)	
3%)	
3%)	

的女性
併發症
至卵巢
組大都
3%，
或許
經很少

則何種

組	
9%)	
4%)	
6%)	
1.1%)	

，相
者相
員處皆
可以護