

肉毒桿菌素注射治療半臉痙攣

1. 肉毒桿菌素可以阻斷神經肌肉的連結，而使肌肉不收縮，可達到治療半臉痙攣的療效。
2. 半臉痙攣的病因至今仍然不明，除肉毒桿菌素注射外，可嘗試藥物等方式治療，但肉毒桿菌素注射仍是目前效果最佳的治療方式之一。
3. 肉毒桿菌素注射治療半臉痙攣依據台灣健康保險局的規定必須是”痙攣量表”(Spasm intensity scale) 第3級：中度但明顯之眼瞼痙攣，且引起生活不便，或第4級：嚴重之眼瞼痙攣，且嚴重影響生活。症狀較輕患者須自費治療。
4. 肉毒桿菌素注射治療半臉痙攣之劑量可因嚴重度，病人體質而有所不同，但依過去大多數病人之經驗及健康保險局的規定，每次以 30 單位為原則。
5. 肉毒桿菌素注射治療半臉痙攣之部位包括：眼輪肌(Orbicularis Oculi)，皺紋肌(Corrugator)，額肌(Frontalis)，大顴骨肌(Zygomaticus major)，小顴骨肌(Zygomaticus minor)，其他
6. 肉毒桿菌素注射治療半臉痙攣治療效果會在注射後約一週後發生，約可以持續約 3-4 月，但療效可能因人而異。
7. 肉毒桿菌素注射治療半臉痙攣的副作用及併發症包括：
 - (1) 過敏反應，病人因特殊體質而引起，可能致命，但發生率很低。
 - (2) 治療局部感染，發生率很低。
 - (3) 上眼瞼下垂或顏面肌肉乏力，可能造成美觀上或生活上的障礙，但這類較常見的副作用會在 3-4 月內恢復，不會造成永久性的傷害。
8. 一般而言，肉毒桿菌素注射治療半臉痙攣應每 3-4 月施行一次。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。