

<藥物效用>

本藥可用於治療轉移性的前列腺癌。

<服藥指示>

1. 請按照醫師指示服藥，此藥通常一天服用一粒。
2. 儘可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。

<注意事項>

- 1.因本藥可能會對胎兒造成傷害，故服用本藥期間，應採取可靠的避孕措施。本藥不可用於孕婦及正在哺乳的婦女。
- 2.若對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。
- 3.請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物（包括非處方藥品、維他命及中草藥），如抗凝血劑(如 warfarin)、阿斯匹靈、免疫抑制劑等。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：熱潮紅、搔癢、胸部腫脹或疼痛、性慾降低、性障礙、腹瀉、頭痛、暈眩、發汗等，這些症狀會隨時間慢慢減弱，若情況未改善或惡化，請與醫師連絡。
- 2.若出現視覺改變、噁心、嘔吐、胃痛、食慾喪失、尿液顏色變深、類似感冒的症狀、皮膚或眼球變黃、上腹部疼痛等情形，請立即與醫師聯絡。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。