

傷科大成

接骨入骱用手巧法-依體位分類

原文

跌打碰傷，頭顱猝死者，身雖僵直，口鼻尚有出入氣，心口尚溫跳動者，使患者盤坐，發，伏我膝上。傷處先敷定痛散，隨以火紙卷條點火，令煙熏其口鼻，通和臟腑血脈之氣，待口中出聲，以熱陳酒和灌定痛散，或炒蘿卜子泡湯灌之。外用手摩其胸腋，並托其手腕，頻頻揉其兩手脈窠。被傷之筋脈強硬，得揉摩而心脈和運，命脈流通，即可回生。若傷重已死者，用白布纏其頭，以木棍長尺半，圓如錢大，輕輕拍其足心，再提其發，令項正直，舒其經絡。如皮未破，骨碎膜穿，血向內流，聲啞不言，面青唇黑者，不治。或頂骨塌陷，七竅出血，身僵昏迷者不治。惟皮開肉綻，血流不止者，先止其血，服補氣養血藥，當戒欲避風。如染破傷風，牙關緊閉，角弓反張，即進疏風理氣湯，俟身不發熱，與補中益氣湯。

傷囟門肉腫皮未破者，昏沉不語，扶起正坐，以蔥汁和敷定痛散，次以粗紙蘸醋貼藥上小熨斗烙紙上，內覺熱痛，口出聲為度。去藥貼損傷膏。如皮破血流不止，骨陷筋翻者

不治。凡傷頭頂、兩旁棱骨、額骨正中、兩額角、眼眶骨、顴骨，均照囟門傷治法。

打傷眼珠落出者，先以銀針蘸井水，將收珠散點紅筋，次用青絹蘸溫湯擲進。即服還魂湯，再投明目生血飲。

鼻梁骨斷者，先捏正斷骨，摻以止血丹。如鼻已傷落下者，急趁血熱，蘸發炭末粘貼，不可歪斜，加絹條扎緊，遲則血冷不能粘。服壯筋續骨丹。如骨未碎斷，只貼損傷膏，服吉利散。骨碎內膜破者，口鼻流血者不治。

砍跌打落耳朵，或上落下粘者，或下脫上連者，急拈正用封口金瘡藥。若全落下者，急余末貼原位，將兩耳相對，次以竹片夾緊，加布條扎好。如耳門骨傷重而體素虧，昏沉者不口唇豁開者，先摻麻藥，急以小箝箝牢油絲線穿合其縫，不可歪斜。摻金瘡藥，貼損傷外以絹條在唇上扎向腦后縛定。服活血止痛散，常飲稀粥，不可言笑，及呷食物。如血已冷，先敷麻藥，以刀尖剛破，血出時急縱合，須手快為妙。仍服前藥。口含刀誤割其舌，將斷未落者，急用雞蛋殼內衣貯其舌，蜜調敷止血定痛散，頻頻添換。使患者仰臥，稀粥灌飲，不動其舌，則易愈。或戮傷上 正中之孔，面腫色青，血流不止，痛連腦髓。若傷會厭，昏沉不語，痛連心

膈。急研鉛粉、冰片吹患處以止其血，再用蟹黃、血竭煎湯，每日口漱三十次，內服定痛散。

下頰一骹脫下者，遂不便言語飲食，其骹如剪刀股樣。先以布包手大指入其口，余指抵邊，輕輕捺下，用力向上一推，而進骹有響聲，齒能合者複位多。得于腎虛者，外加布條兜裹于項后，常進補腎養血湯，次進補腎丸。

頸項骨難于損折，有登高倒跌，損骨外出者，重者三時死。輕者捏平其骨，相對原筭。

貼損傷膏，次以布條連肩背絡之，投砂仁泡湯煎吉利散。

缺盆外鎖子骨傷斷者，先拿胸骨，將肩頭向內合之，揉摩斷骨令其複位，加帶掛肩于項，敷定痛散，不可搖動，服接骨藥。

肋骨斷者，骨不能對，須捏骨平正，外貼損傷膏，內服壯筋續骨丹。

肩骹與膝骹相似，肩骹落下，手不能舉，將上一手擒住其肩下，一手拿住其手，輕輕轉使其筋舒。再令患者坐于低處，一人抱住其身，將手拔直，用推拿法。又兩手捏其肩，抵住其臂骨，將膝夾住其手，齊力推上。骹內有骹聲，乃複舊位，手自能舉動。如無響聲者，骹未能上，仍照前法而行。

先以熟牛皮，長五寸、寬三寸，兩頭各開二孔，貫以棉繩，內貼損傷膏，加以棉花蓋之。又用棉裹如雞卵大，夾于夾窩內，複以牛皮夾緊肩之前后，加布纏好后，以扶手板，長二寸，寬四寸，兩頭穿繩，懸掛空中，令患者俯伏于上，不使其肩骨下垂，俟全愈方可撤板。若不依此法，后必遺殘患蘆節。服獨活桂枝湯。

臂骱落出者，以上一手抬住其灣，下一手拿住其脈踝，令其手伸直，拔下遂曲其上，后灣，捏平湊合其攏，內有響聲，使其手曲轉，搭著肩膊，骱可合縫矣。貼損傷膏，多以布每頭釘帶四根，裹扎臂骨，複以竹帘照患處大小為度，圍緊布外，使骨縫無參差走脫之患，以引經藥煎湯和吉利散。

手掌處腕骨被跌撲打傷，骱骨脫出者，腕縫必開，以兩手先揉其腕，一手拿住其指，一住其凹處，拔其手指，伸直手掌，曲起手骱，曲下一伸而上，骱內有響聲，掌可活動，已複舊位。但骱出不用綁。如骨斷者先貼損傷膏，加布扎緊。將闊板一片，撐住患裡；再以木板四片，長三寸，加布扎緊，俟愈方去板。煎桂枝湯和吉利散。

手指有三骱，中節脫出者，拔出捏正，拈其指伸出挺直，一推即上，能屈伸則愈。不可洗，以桂枝煎活血止痛飲。手

指痛過于別處，若傷一指，痛必連心，中指尤甚。一染破傷風，外敷金瘡藥，內服疏風理氣湯。

被人咬傷手指者，先以童便淋洗，捏去牙根毒瓦斯。用炙龜板灰末麻油和敷，又以紙蘸麻火熏之。如患處破傷風，進疏風理氣湯。若刀斧砍斫傷者難治。臀處肉濃，骨粗，骺脫比諸骺難于擒拿合攏（又名胯骨）。若骺脫白者，則觸在股內，須用大力人四個幫扶，使患者側臥，一人抱住其身，一人擒住膝上，先將臂骺拔直，上手擒住其腰，下手捧住其腿灣，將膝曲轉向上，使膝近其腹，再令伸直，骺內有響聲，即歸舊白。出左臀攀向右，向右拔直而上。

出右臀攀向左，向左拔直而上。貼損傷膏，服生血補髓湯。

大腿骨骺脫者，一手擒住其膝，一手拿住其膀，上下拔直，將膝曲轉，抵住臀瓣，骺內聲，始為合攏。敷定痛散，服生血補髓藥。腿骨折兩段者，先煎寬筋散熏洗，令患者側臥于床，患足拿與無患足齊，貼損傷膏。用布二條，長五寸、寬二寸、裹膏藥上。外以紙包杉木板八片，長七寸。又用布三條，與木板和扎齊緊。先進活血止痛散，次投壯筋續骨丹。大小腿皮破骨斷者，拿骨平正，貼損傷膏。用杉木板六片，

長二寸半，上骨斷板寬七分，下骨斷板寬五分，加布扎緊，取其擔力，不致歪走。此症痛極，先以止痛丹，后投壯筋續骨丹。

膝骹處油盞骨，在膝蓋之處，其骹脫出于上者，使患者仰臥，一人抬起足踝，若出于左左而下；出于右，隨右而下。醫者緩緩雙手挾擒，上手拿住其膝，下手擒住其足，彎使骹對膝上，手擒膝下，手向上一抬則上。貼損傷膏，服壯筋續骨丹。膝蓋離位向外側者，則內筋腫脹。向內側者，則筋直起灣腫，看其骨如何斜錯，依法捏拿，複其原位，服補筋藥。膝蓋骨，名護膝骨，有傷為兩塊者，或三塊，將兩腳伸直，捏其骨平伏。用薄篾片照膝蓋骨之大小，做一篾圈，套于患上，次以布四條，扣于圈上，連膝灣扎緊。先貼損傷膏，服止痛接骨丹，不必換膏藥。受傷足放床上，不可下地，半月后，用軟棉放足灣處，逐日墊高，使灣曲如舊。常煮鴨食，又恐碎骨，未長好複行損傷，將馬桶墊與床一樣高，以大便不可下，水洗至全好。去篾圈如籬，月余骨仍兩片者，一生跛足，不可治，服當歸湯。

當歸 乳香 沒藥 川斷 陳皮 五加皮 生地 牛膝 骨碎
補 紅花 木瓜 如發熱，加柴胡、桔梗各一錢。發腫，加黃

芩，水酒各半煎，空心服。

小腿有二骨，一大一小，斷一根者易治，斷兩根者難治。
直挺者易治，分兩段者難治。

骨捏對平正，敷金瘡藥，貼損傷膏，不可水洗。用木板六片，長三寸五分，加布條扎好，二日一換。此症極痛，先服接骨丹，次以壯筋續骨丹。

腳踝骨易出易入，一手抬住其腳踝，一手拿住其腳踝，將踝拔直捏正，其骨複于舊位。

出手偏于左，右踝出手偏于右，腳指曲上，腳跟曲下，一伸而上，骸有響聲，活動如故。夾以木板，加布扎緊。二日后再看，如未平直，仍撥端正。貼損傷膏，服寬筋活血散。若行走過早，使骨斜出。向內歪者，則內踝突出腫大；向外歪者，則外踝突出腫大。須待氣血充足，方可行動。

足背之骨縫錯出，輕輕搓捏，令其骨合筋舒，貼損傷膏，服補筋藥。

腳指撇傷前半截，翻下斷者，或翻上斷，將左手捏住其足兩側，再以右手捏平斷足指，鑲接原位。貼損傷膏，以帶扎緊，不可下水洗，服壯筋續骨丹。

手足之筋多在指，指傷覺痛，則筋必促，煎寬筋散熏洗，

輕輕揉捏，再行搖動伸舒。如骨與筋斷者，不可熏洗。

註釋

骭：骨之小筍也。