

脈衝高頻熱凝療法

[發表醫師] :護理指導 醫師(神經外科)

[發布日期] :2011/3/15

一、高頻熱凝療法的目的：

此手術是經由脈衝及定溫的刺激方式，阻斷痛覺神經，並未破壞神經，為免開刀的治療方式。

二、手術治療進行方式：

- 1.採用局部麻醉，不需禁食。
- 2.在放射線定位輔助下，將穿刺針進入患部後，再利用攝氏 42℃ 脈衝高頻電磁波，以每秒刺激疼痛點兩次，持續作用在神經組織上，約 3-5 分鐘，使患者對疼痛的感覺降低。
- 3.治療結束後拔除電燒針，傷口只有針孔般大小。
- 4.在正常情況下患者當天可返家休息。

三、術後注意事項：

- 1.手術後覆蓋於傷口的紗布，在當日洗澡時可取下，3 天內不可泡澡。
- 2.手術後兩天內會感覺些許針感、微脹感(與原來疼痛不同)，此為正常現象，手術後 2-3 天疼痛會些許回復，此療法效果會在一星期後達到最好，請於手術後一星期務必回診，確定疼痛原因。
- 3.手術後務必保持正確坐、站姿勢，也不可搬運重物。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。