

※黃疸病脈證并治_{第十六 367}

穀疸之為病，寒熱不食，食即頭眩，心胸不安，久

久發黃為穀疸，茵陳蒿湯主之。

〔註〕：

此詳申穀疸之為病也。未成穀疸之時，其人多病寒熱。寒熱作時，則不能食；寒熱止時，則或能食，雖能食，然食後即頭暈目眩，心煩不安，此為濕瘀熱鬱而內蒸，將作穀疸之徵也。久久身面必發黃，為穀疸矣。宜茵陳蒿湯利下，使從大小二便而出之。

※黃疸病脈證并治_{第十六 368}

茵陳蒿湯方：茵陳蒿_{六兩} 梔子_{十四枚} 大黃_{二兩}

上三味，以水一斗，先煮茵陳，減六升，內二味，煮取三升，去滓，分溫三服。小便當利，尿如皂角汁狀，色正赤，一宿腹減，黃從小便去也。

※黃疸病脈證并治_{第十六 369}

陽明病，脈遲者，食難用飽，飽則發煩，頭眩，小

便必難，此欲作穀疸。雖下之，腹滿如故，所以然者，

脈遲故也。

〔註〕：

穀疸屬胃熱，脈當數，今脈遲，脾藏寒也。寒不化穀，所以雖饑欲食，食難用飽，飽則煩悶，胃中填寒健運失常也。清者阻於上升，故頭眩；濁者阻於下降，故小便難也。此皆欲作穀疸之徵。其證原從太陰寒濕鬱黷而生，若誤以為陽明熱濕發黃，下之雖腹滿暫減，頃復如故，所以然者，脈遲寒故也。此發明欲作穀疸，屬脾陰寒化而不可下者也。

〔集註〕：

程林曰：脈遲為寒，寒不殺穀，故食難用飽。飽則穀氣不消，胃中苦濁，濁氣蘊蓄則發煩，熏蒸則作眩也。小便難者，以脈遲則無陽以施化濁氣，但留於胃而不宣，是以欲作穀疸。若下之，徒虛其胃而腹滿如故也，所以然者，以脈遲為寒之故也。

※黃疸病脈證并治_{第十六 370}

黃家，日晡所發熱，而反惡寒，此為女勞得之，膀胱

急，少腹滿，身盡黃，額上黑，足下熱，因作黑疸，

其腹脹如水狀，大便必黑，時澹，此女勞之病，非水

也，腹滿者難治，硝石礬石散主之。

〔註〕：

此詳申女勞疸之為病。黃疸日晡所發熱，乃陽明熱症，當不惡寒也；而反惡寒者，非陽明熱症，此或為女勞得之也。女勞得之疸證，雖膀胱急，少腹滿，而小便自利；身雖盡黃，而額上則黑；雖發熱，惟足下甚，此少陰熱因作黑疸也。故腹脹如水狀，而大便必黑，時澹，知非水脹病，乃為女勞得之疸脹病也。時澹黑色者，亦藏病及血之徵也。血病者顏必變，豈有色黑而血不病者乎？女勞疸腹滿者為難治，以其脾腎兩敗也。以硝石入血消堅，礬石入氣勝濕，然此方治標固宜，非圖本之治，世久書訛，姑辨其理也。

〔集註〕：

尤怡曰：黃家，日晡所本當發熱，今發熱而反惡寒者，此為女勞得之疸也。熱在胃淺而腎深，故熱深則先反惡寒也。膀胱急，額上黑，足下熱，大便黑，皆腎熱之徵。雖少腹滿脹有如水狀，而實為腎氣不行，非脾濕而水不行也。惟是證兼腹滿，則脾腎並傷，而其治為難耳！硝石鹹寒除熱，礬石除痼熱在骨髓，骨與腎合，用以清腎熱也。大麥粥和服，恐傷胃也。