

※驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治_{第十二 237}

病人面無血色，無寒熱，脈沉弦者，衄；脈浮弱，

手按之絕者，下血；煩欬者，必吐血。

〔按〕：

脈沉當是「脈浮」；脈浮當是「脈沉」，文義始屬，必傳寫之訛。

〔註〕：

赤色，血色也。面無血色，謂面白之人，純白而無赤；面黃之人，純黃而不紅也。

人有恐怖，則面色脫白，其狀驚駭；人有愧心，乍白乍紅，其狀惶怯。

今無故而面無血色，則可知非驚愧致氣亂血散也；且無寒熱病，又可知非虛損不生血、少血也。既非血散，又非血少，當詢之病人，必有失血之故。診之於脈，必有吐衄、下血之因。衄吐屬陽，

故脈見浮弦，按之必芤，榮血空也；下血屬陰，脈見沉弱，按之欲絕，榮氣微也。且脈色如斯，而證兼煩欬，是病在心肺，故必吐血也。

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治_{第十二 238}

夫吐血，欬逆，上氣，其脈數，而有熱，不得臥者，

死。

〔註〕：

吐血欬逆，肺大傷也；上氣，肺無降也；脈數有熱，火燔肺金也；不得臥者，陽不入陰，故曰死也。

〔集註〕：

趙良曰：脈數有熱，陽獨勝也。不能臥，陰已絕也。陰既絕，陽豈獨生耶？故死。若得臥者，陰未絕，未可言死。

程林曰：吐血、欬逆、上氣，則肺藏傷矣。脈數則虛熱不去，火來刑金矣。陰血消亡，故不得臥，死可必矣。