

<藥物效用>

用於婦女因更年期所引起之諸症狀或卵巢切除患者之治療

<服藥指示>

1. 請按照醫師指示服藥
2. 每天口服一錠，持續不需間斷。
3. 建議每天於固定時間服用。
4. 請依次由白色錠開始服用，再服用藍色錠，最後服用粉紅色錠。
5. 若忘記服藥，請於 12 小時內補服，若超過 12 個小時，則放棄未服的藥錠，等到下一次服藥時間繼續服用當天藥錠。

<注意事項>

1. 此藥品禁用於懷孕婦女。
2. 若對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。
3. 若須服用其他藥物時，應告訴醫師正在服用此藥。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：不規則出血、乳房觸痛、噁心、嘔吐、頭痛、水腫。這些副作用會隨著時間延長而逐漸消失，當停止服用後，副作用亦會消失。
2. 若以上症狀越來越嚴重或是出現紅疹、搔癢等過敏反應，請立即與醫師聯絡。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。