

※嘔吐噦下利病脈證并治第十七 443

下利清穀，不可攻其表，汗出必脹滿。

〔註〕：

詳見傷寒論太陰篇內，不復釋。

※嘔吐噦下利病脈證并治第十七 444

下利脈沉而遲，其人面少赤，身有微熱，下利清穀

者，必鬱冒，汗出而解，病人必微厥，所以然者，其

面戴陽，下虛故也。

〔註〕：

詳見傷寒論厥陰篇內，不復釋。

※嘔吐噦下利病脈證并治第十七 445

下利腹脹滿，身體疼痛者，先溫其裏，乃攻其表，

溫裏宜四逆湯，攻表宜桂枝湯。

〔註〕：

詳見傷寒論太陰篇內，不復釋。

※嘔吐噦下利病脈證并治第十七 446

桂枝湯方：

桂枝 三兩 芍藥 三兩 甘草 三兩，炙 生薑 三兩 大棗 十二枚

上五味，■咀，以水七升，微火煮取三升，去滓，適寒溫服一升。服已須臾，啜熱稀粥一升，以助藥力，溫覆令一時許，遍身絜絜微似有汗益佳，不可令如水淋漓。若一服汗出病差，停後服。

無字圖譜■咀

呬

※嘔吐噦下利病脈證并治_{第十七 447}

下利後更煩，按之心下濡者，為虛煩也，梔子豉湯

主之。

〔註〕：

詳見傷寒論太陽中篇，不復釋。

※嘔吐噦下利病脈證并治_{第十七 448}

梔子豉湯方：梔子_{十四枚} 香豉_{四合，綿裹}

上二味，以水四升，先煮梔子，得二升半，內豉煮取一升半，去滓，分二服，溫進一服，得吐則止。

※嘔吐噦下利病脈證并治_{第十七 449}

下利，肺痛，紫參湯主之。

〔按〕：

此文脫簡不釋。

※嘔吐噦下利病脈證并治_{第十七 450}

紫參湯方：紫參_{半斤} 甘草_{三兩}

上二味，以水五升，先煮紫參，取二升，內甘草，煮取一升半，分溫三服。