

<藥物效用>

- 1.精神疾病用藥
- 2.躁鬱症用藥

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.服用此藥期間，請避免喝酒。

<注意事項>

- 1.假若你有懷孕或是哺乳，請在服用此藥前告知你的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥品。其中特別要注意的有：憂鬱症用藥、癲癇用藥、降血壓藥等。
- 4.若您有癲癇、心臟疾病、腎臟疾病、肝臟疾病，請告知您的醫(藥)師。
- 5.假若患有糖尿病請告知你的醫(藥)師，因為此藥可能會造成血糖上升。
- 6.服用此藥時，可能會引起困倦或眩暈，應避免駕車或操作具有危險性的機械。
- 7.這個藥品可能會造成你對陽光敏感，因此外出時記得使用防曬用品。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：焦慮、睡眠品質不佳、噁心、便秘、腹瀉、胃不適、排尿不順、體重增加、性慾降低、對溫度敏感、視覺模糊，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：發燒、出汗、肌肉僵硬、無法控制的肌肉運動、嚴重頭痛、吞嚥困難、癲癇、不正常出血。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。