

備急千金要方

解毒雜治方-解百藥毒第二

原文

論曰：甘草解百藥毒，如湯沃雪，有同神妙。有人中烏頭、巴豆毒，甘草入腹即定。中藜蘆毒，蔥湯下咽便愈。中野葛毒，土漿飲訖即止。如此之事，其驗如反掌，要使人皆知之。

然人皆不肯學，誠可嘆息。方稱大豆汁解百藥毒，余每試之，大懸絕不及甘草，又能加之為甘豆湯，其驗尤奇。有人服玉壺丸，治嘔不能已，百藥與之不止，藍汁入口即定。如此之事，皆須知之，此成規更不須試練也。解毒方中條例極多，若不指出一二，學人不可卒知，餘方例爾。

石藥毒 用白鴨屎、人參汁。

雄黃毒 用防己。

鐵粉毒 用磁石。

石毒 用大豆汁、白鵝膏。

防葵毒 用葵根汁。

大戟毒 用菖蒲汁。

桔梗毒 用白粥。

甘遂毒 用大豆汁。

躑躅毒 用梔子汁。

雞子毒 用醇醋。

馬刀毒 用清水。

野芋毒 用土漿、人糞汁。

杏仁毒 用藍子汁。

百藥毒 用甘草、薺、大小豆汁、藍葉根、實汁。

金銀毒 用水銀服數兩即出，或雞子清及屎白燒豬脂和服，水淋雞屎汁煮蔥汁。

芫花毒 用防己、防風、甘草、桂汁。

野葛毒 用雞子清、葛根汁、甘草汁、鴨頭、熱血、豬膏、雞屎、人屎。

藜蘆毒 用雄黃，溫湯煮蔥汁。

烏頭、天雄、附子毒 用大豆汁、飴糖、防風、遠志、棗肉。

射罔毒 用藍汁、大小豆汁、竹瀝、大麻子汁、藕汁、薺汁、六畜血、貝齒屑、蚯蚓屎。

半夏毒 用生薑汁及煮乾薑汁。

莨菪毒 用薺、甘草、犀角、蟹汁、升麻。

野狼毒毒 用杏仁、藍汁、白蘂、鹽汁、木占斯。

巴豆毒 用黃連煮汁、大豆汁、菖蒲汁、生薑汁（《肘後》云：小豆薑）煮寒水石汁。

蜀椒毒 用葵子汁、蒜汁、豉汁、桂汁、人尿、冷水、土漿、雞毛燒吸煙及水調服。

斑蝥、芫青毒 用豬膏、戎鹽、大豆汁、藍汁、巴豆、鹽湯煮豬膏。

服藥過劑悶亂者 用水和胡粉、水和葛粉、地漿、豉汁、荷汁、粳米沈、乾薑、黃連、飴糖、藍汁 吞雞子黃上解毒諸藥，一例中有數味者，但得一味即是，不必悉具。

解一切毒藥發不問草石，始覺惡即服此方：

豉（二升） 生麥門冬 蔥白（各八兩）

上三味，以水七升，煮取二升半，分三服。

雞腸草散解諸毒方。

雞腸草（三分） 薺 升麻（各四分） 芍藥 當歸 甘草（各一分） 坩土（一分） 藍 子（一合）

上八味，治下篩，水服方寸匕，多飲水為佳。若為蜂、蛇等毒蟲所螫，以針刺螫上，血 出，著藥如小豆許於瘡中，令濕瘥。若為射罔箭所中，削竹如釵股長一尺五寸，以綿纏

繞，水沾濕，取藥納瘡中，隨瘡深淺令至底止，有好血出即休。若服藥有毒，水服方寸匕，毒解 痛止愈。

解毒藥散方：薺（一分），藍（並花，二分）

上二味，七月七日取藍，陰乾搗篩，水服方寸匕，日三。

又方 取秦燕毛二七枚，燒灰服。

解一切毒方：

母豬屎水和服之。又水三升三合和米粉飲之。

解鳩毒及一切毒藥不止煩懣方：

甘草 蜜（各四分） 梁米粉（一升）

上三味，以水五升煮甘草，取二升，去滓，歇大熱，納粉湯中，攪勻調，納蜜更煎，令熟如薄粥，適寒溫飲一升。

治食葇荂，悶亂如卒中風，或似熱盛狂病，服藥即劇方：

飲甘草汁、藍青汁即愈。

治野葛毒已死口噤者方：

取青竹去兩節，柱兩脅臍上，納冷水注之，暖即易，須臾口開，開即服藥立活，唯須數易水。

治鉤吻毒困欲死、面青口噤，逆冷身痺方：（《肘後方》云：鉤吻、茱萸、食芹相似，而薺 八兩 咀，以水六升，煮取三升，冷如人體，服五合，日三夜二。凡煮薺，唯令濃佳。

又方 煮桂汁飲之。

又方 啖蔥涕佳。(蔥涕治諸毒。)

治腹中有鐵方：

白折炭刮取末，以井花水服三錢，不過再服。