

<藥物效用>

治療結核病，需長期服藥，切勿因症狀緩解而擅自停藥。

<服藥指示>

- 1.擅自減藥、停藥可能造成多重抗藥性菌種產生，或再變成開放性結核病而傳染他人，故請配合醫師的指示服藥，請勿擅自停藥。
- 2.每日於相同時間服藥。忘記服藥請盡快服用；若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.若您有糖尿病，痛風及肝腎方面的疾病，請告知您的醫(藥)師。
- 2.若您對此藥或其他藥物過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.為確知藥物交互作用情形，若您同時有服用其他藥品，請主動告知醫師。
- 4.服藥期間，身體的分泌物或排泄物(如汗液、尿液等)會變為橘紅色，此為正常現象，不會影響正常生理功能，請勿驚慌。
- 5.此藥會影響口服避孕藥的效果，故必要時，請採用其他避孕措施，如保險套。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若出現噁心、嘔吐、胃腸不適等，請勿太驚慌，這些症狀會隨時間慢慢改善。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有以下情形，須立即請醫師處置：異常肌肉疼痛、急性痛風、關節痠痛、皮膚發疹、手腳出現刺痛麻的感覺、不正常出血。
- 3.部份病患之肝功能指數可能上升，故如果您有食慾不振、異常疲倦、虛弱，甚至出現眼睛及皮膚泛黃、尿液顏色變深等症狀，請立即聯絡您的醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。