

※刪補名醫方論卷八-方劑 156

黃芩湯

治太陽，少陽合病，自下利者。若嘔者，加半夏、

生薑。

黃芩、甘草、芍藥 各三兩 大棗 擘，十二枚。上四味，以水一斗，

煮取三升；去滓，溫服一升，日再服，夜一服。嘔者，加半夏半升、

生薑三兩。

〔集註〕：

程應旂曰：此之合病者，頭痛，胸滿口苦，咽乾，目眩，或往來寒熱，或脈大而弦，半表之邪，不待太陽傳遞而即合。少陽裡氣失守，所以下痢，陽熱漸盛，所以上嘔。故用黃芩湯清熱益陰，半裡清而半表自解矣。

柯琴曰：太陽、少陽合病，是熱邪已入少陽之裡。膽火下攻於脾，故自下痢，上逆於胃，故兼嘔也。與黃芩湯，酸苦相濟，調中以存陰也。熱不在半表，故不用柴胡，今熱已入半裡，故黃芩主之。雖非胃實，亦非胃虛，故不須人參以補中。兼嘔者，故仍加半夏、生薑，以降逆也。

※刪補名醫方論卷八-方劑 157

黃連湯

治傷寒胸中有熱，胃中有邪氣，腹中痛欲嘔吐者。

黃連 三兩 乾薑 三兩 甘草 三兩 人參 二兩 桂枝 三兩 半夏 半升

大棗 十二枚。上七味，以水一斗，煮取六升；去滓，溫服一升，日三服，

夜二服。

〔集註〕：

程應旂曰：熱在胸中，有煩躁鬱悶之證可知。胃中反有邪氣，以寒邪被格在下故也。此證寒熱俱有，較之大青龍之寒熱，已向近裡一層，故其證不見之表裡際，而只見之上下際。腹中痛者，陰邪在胃而寒乃獨治於下也。欲嘔吐者，陽邪在胸，而熱乃獨治於上也。此為上下相格治法，亦寒熱並施，而辛寒易以苦寒，辛熱加以苦熱，更以人參、半夏以補宣中氣，升降陰陽。自此條而互及瀉心諸湯，皆其法也。

成無己曰：濕家下後，舌上如胎者，以丹田有熱，胸中有寒，是邪氣入裡而為下熱上寒也。此傷寒傳裡而為下寒上熱也。

喻昌曰：陰陽悖逆，皆當和解法。

※刪補名醫方論卷八-方劑 158

黃連阿膠湯

治少陰病，得之二、三日以上，心中煩不得臥。

黃連 四兩 黃芩 一兩 芍藥 二兩 雞子黃 二枚 阿膠 三兩。上五

味，以水五升，先煮三物，取二升，去滓，納膠烊盡，小冷，納雞子黃，

攪令相得，溫服七合，日三服。

〔集註〕：

柯琴曰：此少陰病之瀉心湯也。凡瀉心必藉連、芩，而導引有陰陽之別。病在三陽，胃中不和，而心下痞硬者，虛則加參、甘補之，實則加大黃下之。病在少陽，而心中煩不得臥者，既不得用參，甘以助陽，亦不得用大黃以傷胃矣。用芩、連以直折心火，用阿膠以補腎陰，雞子黃佐芩、連於瀉心中補心血，芍藥佐阿膠於補陰中斂陰氣，斯則心腎交

合，水升火降。是以扶陰瀉陽之方，變而為滋陰和陽之劑也。是則少陰之火，各歸其部，心中之煩不得臥可除矣。經曰：陰平陽秘，精神乃治。斯方之謂歟！

※刪補名醫方論卷八-方劑 159

理中湯丸

治中氣不運，腹中不實，口失滋味，病久不食，臟

腑不調，與傷寒直中太陰，自痢不渴，寒多而嘔等證。

人參 三兩 白朮 三兩 甘草 三兩 乾薑 三兩。上四味，搗篩為末，

蜜丸如雞子黃大，以沸湯數合和一九，研碎，溫服之。日三、四枚，夜

二枚；腹中未熱，益至三、四丸。然不及湯，湯法以四物依兩數切，用

水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

- (1)若臍上築者，腎氣動也，去朮加桂四兩。
- (2)多吐者，去朮加生薑三兩。
- (3)下多者，還用朮。
- (4)悸者，加茯苓二兩。
- (5)渴欲得水者，加朮，足前成四兩半。
- (6)腹中痛者，加人參，足前成四兩半。
- (7)寒者，加乾薑，足前成四兩半。
- (8)腹滿者，去朮加附子一枚。服湯後如食頃，飲熱粥一升許，微自溫勿發衣被。

〔集註〕：

程應旆曰：陽之動始於溫，溫氣得而穀精運，穀氣升而中氣贍，故名曰理中，實以燮理之功，予中焦之陽也。若胃陽虛，則中氣失宰，膈中無發宣之用，六腑無灑陳之功，猶如釜薪失焰，故下致清穀，上失滋味，五臟凌奪，諸證所由來也。參、朮、炙草，所以守中州，乾薑辛以溫中，必假之以焰釜薪而騰陽氣，是以穀入於陰，長氣於陽，上輸華蓋，

下攝州都，五臟六腑，皆以受氣，此理中之旨也。若水寒互勝，即當脾腎雙溫，加以附子，則命門益土母溫矣。白朮補脾，得人參則壅氣，故臍下動氣；吐多腹滿者，去朮也。加桂以伐腎邪，加生薑以止嘔也。加附子以消陰也。下多者濕勝也，還用朮燥濕也。渴欲飲水飲渴也，加朮使飲化津生也。心下悸停水也，加茯苓導水也。腹中痛倍人參，虛痛也。寒者加乾薑，寒甚也。