

※瘡癰腸癰浸淫病脈證并治 第十八 451

諸浮數脈，應當發熱，而反洒淅惡寒，若有痛處，

當發其癰。

〔註〕：

諸浮數脈，謂寸、關、尺六脈俱浮數也。浮脈主表，數脈主熱，若是表邪，則當發熱而洒淅惡寒也。今非表邪，應當發熱，不當惡寒，若有痛處，乃當發癰之診，非表邪之診也。

〔集註〕：

周揚俊曰：病之將發，脈必兆之。夫浮數陽也，熱也，浮數兼見，為陽中之陽，是其熱必盡顯於外矣。而反洒淅惡寒，證不相應，何哉？必其氣血凝滯，榮衛不和，如經所謂榮氣不從，逆於肉理，乃生癰腫。陽氣有餘，榮氣不行，乃發為癰是也，況其身已有痛處乎。夫脈之見者陽也，其將發而痛者亦屬陽，故曰當發其癰。

※瘡癰腸癰浸淫病脈證并治 第十八 452

師曰：諸癰腫，欲知有膿無膿，以手掩腫上，熱者

為有膿，不熱者為無膿。

〔註〕：

諸癰腫者，謂諸陰陽癰腫也。不論陰陽，凡諸癰腫欲知有膿無膿，當以手掩之腫上，熱則能腐化成膿，故熱者為有膿，不熱者為無膿也。

〔集註〕：

周揚俊曰：師之所以教人，知癰已成欲其潰，未成托之起也。

※瘡癰腸癰浸淫病脈證并治 第十八 453

腸癰之為病，其身甲錯，腹皮急，按之濡如腫狀，

腹無積聚，身無熱，脈數，此為腸內有癰膿，薏苡附

子敗醬散主之。

〔註〕：

癰生於內，則氣血為癰所奪，不能外榮肌膚，故枯皴如甲錯也。腹皮急似腫脹，但按之軟，詢之腹無積聚，審之身無表熱，診之脈數，非有外證也。此為腸內有癰膿也，主之薏苡附子敗醬散，流通腸胃，消癰腫也。