

※辨太陰病脈證并治-條文 12

太陰為病，脈弱，其人續自便利，設當行大黃、芍

藥者，宜減之，以其人胃氣弱，易動故也。

〔註〕：

太陰為病，必腹滿而痛，治之之法，當以脈消息之。若其人脈弱，則其中不實，雖不轉氣下趨少腹，然必續自便利。設當行大黃、芍藥者，宜減之，以胃氣弱，難堪峻攻，其便易動故也，由此推之，可知大便硬者，不論在陰在陽，凡脈弱皆不可輕下也。

〔集註〕：

程知曰：此言太陰脈弱，恐續自利，雖有腹痛，不宜用攻，與建中湯相發明也。

喻昌曰：此段叮嚀與陽明篇中互相發明。陽明曰：不轉失氣，曰：先硬後溏，曰：未定成硬，皆是恐傷太陰脾氣。此太陰證而脈弱，恐續自利，雖有腹痛，減用大黃、芍藥，又是恐傷陽明胃氣也。

汪琥曰：或問大黃能傷胃氣，故宜減；芍藥能調脾陰，何以亦減之？答曰：脈弱則氣餒不充，仲景以溫甘之藥能生氣，芍藥之味酸寒，雖不若大黃之峻，要非氣弱者所宜多用，故亦減之。

※辨太陰病脈證并治-條文 13

傷寒脈浮而緩，手足自溫者，繫在太陰。太陰當發身

黃，若小便自利者，不能發黃，至七、八日，雖暴煩，

下利日十餘行，必自止，以脾家實，腐穢當去故也。

〔註〕：

傷寒脈浮而緩，手足熱者，為繫在太陽，今手足溫，故知繫在太陰也。太陰屬濕，濕與熱瘀，當發身黃，小便自利者，則濕不蓄，熱不瘀，故不能發黃也。若至七、八日大便硬，則為轉屬陽明，今既不硬，雖暴煩下利日十餘行，必當自止，何也？以脈浮緩手足溫，知太陰脾家素實，邪不自容，腐穢當去故也。

〔集註〕：

程知曰：言自利之證，脈浮緩，手足溫，則為脾實也。太陰脈本緩，故浮緩雖類太陽中風，而手足自溫，不似太陽之發熱，更不似少陰、厥陰之厥逆，所以為繫在太陰也。太陰濕熱相蒸，勢必發黃，然小便利，則濕下泄而不發黃矣。此雖暴煩頻利，有似少陰之證，然其利當自止。所以然者，以脈浮緩，手足溫，知其人脾氣實，而非虛寒之比，其濕熱所積之腐穢，自當逐之而下也。若不辨晰而以四逆法治之，則誤矣。

程應旄曰：太陰得浮緩、手足溫之脈證，則胃陽用事，自無藏寒之痛，陰鬱或有之。小便不利必發黃，雖發黃不為陰黃。若小便自利者，不能發黃，陰欲鬱而陽必驅，至七、八日，雖暴煩、下利日十餘行，必自止。所以然者，脈不沈且弱而浮緩，手足不涼而自溫，陰得陽以周護則不寒，不寒則不虛，是為脾家實也。經曰：陽道實陰道虛，陰行陽道，豈肯容邪久住，此則腐穢當去故耳。

汪琥曰：下利煩燥者死，此為先利而後煩，是正氣脫而邪氣擾也。茲則先煩後利，是脾家之正氣實，故不受邪而與之爭，因暴發煩熱也。

※辨太陰病脈證并治-條文 14

太陰中風，四肢煩痛，陽微陰濇而長者，為欲愈。

〔註〕：

太陰中風者，謂此太陰病是從太陽中風傳來者，故有四肢煩疼之證也。陰陽以浮沈言，夫以浮微、沈濇之太陰脈，而兼見陽明之長脈，則為陰病陽脈，藏邪傳府，故為欲愈也。

〔集註〕：

程知曰：傷寒，陰邪也，故自利，宜用四逆。傷風，陽邪也，故煩痛見於四肢。凡太陰病，脈浮者，多是太陰中風。

喻昌曰：微濇之中，更察其脈之長而不短，知元氣未漓，其病當自愈也。

※辨太陰病脈證并治-條文 15

太陰病，欲解時，從亥至丑上。

〔註〕：

邪之解也，必於所旺之時。亥、子、丑乃太陰所旺之時也。當此旺時，故邪不能勝而自解矣。