

<藥物效用>

本藥可用於停經後婦女的乳癌治療。

<服藥指示>

1. 請按照醫師指示服藥，此藥通常一天服用一粒。
2. 儘可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。
3. 若於服用本藥後會感到胃腸不適，可將藥物與食物或牛奶一起併服。

<注意事項>

1. 若您計畫(已)懷孕、哺乳或有肝腎方面疾病，請告知您的醫師或藥師。
2. 若您有或曾有高血脂肪、血栓、高血壓、不正常陰道出血、骨質疏鬆等疾病，請於服藥前告知您的醫師。
3. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物（包括非處方藥品、維他命及中草藥），如抗癌藥(tamoxifen)、口服避孕藥、含有雌性激素(estrogen)的藥品等。
4. 若您對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。
5. 若您將接受手術(包含牙科手術)，請告訴您的醫師或牙醫師，您有服用此藥。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：類似感冒的症狀(如虛弱、咳嗽)、頭痛、熱潮紅、出汗、噁心、嘔吐、腹瀉、心灼熱、體重增加、骨頭或肌肉疼痛、關節痛、憂鬱、不易入睡或失眠、暈眩、陰道出血、口乾等，這些症狀會隨時間慢慢減弱，若情況未改善或惡化，請與醫師連絡
2. 若出現胸部疼痛、發燒、寒顫、呼吸短促、視力模糊或視覺改變、在小腿發生疼痛、腫脹、發紅或發熱、皮膚紅疹、在眼睛、臉、嘴唇、舌頭、手腳發生腫脹等情形，請立即與醫師聯絡。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。