

Rasilez® Film-Coated Tablets 150 mg - 絡舒樂適膜衣錠

[發表藥師] :林敏芝 藥師

[發布日期] :2011/2/10

現代人由於生活緊張、壓力大、飲食不當且常缺乏適當的運動和睡眠，使高血壓病人逐年增加，且發病年齡有不斷下降的傾向。目前高血壓的藥物治療，常採取「階梯式療法」，先用一種類型的藥物治療，如果效果不佳，再考慮更換藥品或者增加另一種藥物治療。最近新上市的降血壓藥物 Rasilez®的有效成分為 aliskiren，作用機轉與傳統藥物不同，這顆藥物是作用於腎素系統源頭，也就是腎臟功能的最上游，達到降血壓和保護腎臟的效果。

絡舒樂適膜衣錠的起始劑量為 75-150 mg 每日一次，若與利尿劑併用時建議起始劑量為 75 mg。血壓未受適當控制的病患，每日劑量可增為 300 mg。劑量超過 300 mg 不會提升降壓反應，但是會提高腹瀉機率。對於老年人病患、輕度至重度腎功能不全及輕度至重度肝功能不全者無須調整起始劑量。

每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：皮膚過敏，腹瀉，咳嗽等。若上述情形持續加重，請立即聯絡您的醫師或藥師。需特別注意的是，在孕婦身上使用此藥品，可能會對發育中的胎兒造成傷害，發現懷孕時，要儘早停藥，並在醫師指導下服用適當的藥物。在臨床使用上，Rasilez®屬後線用藥，要在使用前線降血壓藥物無效時，才會選用本藥品，由於還沒有相關臨床研究證實，目前 Rasilez®不建議使用在小於十八歲的患者身上。在高血壓藥物群中，治療效果因人而異，應該交由醫師來評估決定用藥。病患一定要有耐心，配合長期追蹤，才能找出適合自己的藥物。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行

爲，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。