

醫門法律

脹病諸方

原文

人參芎歸湯（直指） 治煩躁喘急，虛汗厥逆，小便赤，大便黑，名血脹。

人參 辣桂（去粗皮） 五靈脂（炒各二錢五分） 烏藥 蓬朮（煨） 木香 砂仁 炙甘草（各半兩） 川芎 當歸 半夏（湯炮各七錢五分） 上咀，每服一兩五錢，生薑五片，紅棗二枚，紫蘇四葉，煎空心服。

化滯調中湯 白朮（一錢五分） 人參 白茯苓 陳皮 濃朴（薑製） 山楂肉 半夏（各一錢） 神曲（炒） 麥芽（炒各八分） 砂仁（七分） 水二鐘，薑三片，煎八分，食前服。

人參丸 治經脈不利，化為水，流走四肢，悉皆腫滿，名曰血分。其候與水相類，若作水治之，非也，宜用此。

人參 當歸 大黃（濕紙裏，飯上蒸熟，去紙切炒。） 桂心 瞿麥穗 赤芍藥 白茯苓（各半兩） 葶藶（炒另研一錢）

上為末，煉蜜丸如桐子大。每服十五丸，加至二三十丸，空心飲湯下。

見 丸（《寶鑑》）

治寒氣客於下焦，血氣閉塞而成瘕聚，腹中堅大，久不消者。

附子（炮去皮臍四錢） 鬼箭羽 紫石英（各三錢） 澤瀉 肉桂 元胡索 木香（各二錢） 檳榔（二錢半） 血竭（一錢半另研） 水蛭（一錢炒煙盡） 京三棱（五錢銼） 桃仁（三十粒、湯浸去，皮尖麩炒研。） 大黃（二錢銼，用酒同三棱浸一宿焙。） 上十三味，除血竭、桃仁外，同為末，入另研二味和勻，用丸浸藥酒打糊，丸如桐子大。每服三十丸，淡醋湯送下，食前溫酒亦得。

小溫中丸（丹溪）

治脹是脾虛不能運化，不可下之。 陳皮 半夏（湯炮去皮臍） 神曲（炒） 茯苓（各一兩） 白朮（二兩） 香附子（不要烘晒） 針砂（各一兩半醋炒紅） 苦參（炒） 黃連（炒各半兩） 甘草（三錢）

上為末，醋水各一盞，打糊為丸，如桐子大。每服七八十丸，白朮六錢、陳皮一錢，生薑一片煎湯吞下。虛甚加人參一錢，各用本方去黃連，加濃朴半兩，忌口。病輕者服此丸六七兩，小便長。病甚服一斤，小便始長。

禹余糧丸（《三因》）

治十腫水氣，腳膝腫，上氣喘急，小便不利，但是水氣，悉皆主之。（許學士及丹溪皆云：此方治腫脹之要藥。）

蛇含石（大者三兩，以新鐵銚盛入炭火中燒，蛇黃與銚子一般紅，用鉗取蛇黃傾入醋中，候冷取出研極細。） 禹余糧石（三兩） 真針砂（五兩，先以水淘淨炒乾入余糧，一處用米醋二升，就銚內煮，醋干為度後用銚並藥入炭中燒紅鉗出，傾藥淨磚地上，候冷研細。）

以三物為主，其次量人虛實，入下項：（治水多是取輕，按此方三物既非大戟、甘遂、芫花之比，又有下項藥扶持，故虛人老人亦可服。） 羌活 木香 茯苓 川芎 牛膝（酒浸） 桂心 白豆蔻（炮） 大茴香（炮） 莢朮 附子（炮） 乾薑（炮） 青皮 京三棱（炮） 白蒺藜 當歸（酒浸一宿各半兩）

上為末，入前藥拌勻，以湯浸蒸餅，揅去水，和藥再杵極勻，丸如桐子大。食前溫酒白湯送下，三十丸至五十丸。最忌鹽，一毫不可入口，否則發疾愈甚。但試服藥，即於小便內旋去，不動臟腑。病去日日三服，兼以溫和調補氣血藥助之，真神方也。

導氣丸

治諸痞塞，關格不通，腹脹如鼓，大便秘結，小腸腎氣

等疾，功效尤速。

青皮（用水蛭等分同炒赤，去水蛭。） 莪朮（用蛇蟲等分同炒赤，去蛇蟲） 胡椒（茴香炒，去茴香。） 三棱（干漆炒，去干漆。） 檳榔（斑貓炒，去斑貓。） 赤芍（川椒炒，去川椒。） 乾薑（砂炒，去砂。） 附子（青鹽炒，去青鹽。） 茺莢（牽牛炒，去牽牛。） 石菖蒲（桃仁炒，去桃仁。） 上各等分銼碎，與所製藥炒熟，去水蛭等不用，只以青皮等十味，為細末，酒糊為丸，如梧桐子大。每服五十丸，加至七十丸，空心用紫蘇湯送下。

溫胃湯

治憂思聚結，脾肺氣凝，陽不能正，大腸與胃氣不平，脹滿上沖，飲食不下，脈虛而緊澀。

附子（炮去皮臍） 濃朴（去皮生用） 當歸 白芍藥 人參 甘草（炙） 橘皮（各一錢半） 乾薑（一錢一分） 川椒（去閉口者，炒出汗三分。） 上作一服，水二鐘，薑三片，煎至一鐘，食前服。

強中湯

治食啖生冷，過飲寒漿，有傷脾胃，遂成脹滿，有妨飲食，甚則腹痛。

人參 青皮（去白） 陳皮（去白） 丁香（各二錢） 白朮（一錢半） 附子（炮去皮臍） 草果仁 乾薑（炮各一錢） 濃朴（薑製） 甘草（炙各五分） 嘔加半夏。傷面加萊菔子。（各一錢） 水二鐘，薑三片，紅棗二枚，煎一鐘，不拘時服。

註釋

此方治血脹初成者，服之必效。此方即參朮健脾湯，加神曲、麥芽，脹甚者加蘿卜子炒一錢，麵食傷尤宜用。乃助脾之健運，以消其氣分之脹也。此方治血分之水，少用葶藶為使，不至耗氣散氣，殊可取用。此方消瘀之力頗大，用得其宜，亦不為峻。脾虛作脹，最不宜用大黃之藥，散其脾氣，丹溪此方，亦可取用。此方昔人用之屢效，以其暖水臟也。服此丸，更以調補氣血藥助之，不為峻也。此方各味俱用峻藥同炒，取其氣而不取其質，消堅破結，亦能斬關而入。然病久憊甚，用之必不能勝。病勢已成，元氣可耐，早用可以建功。此方變附子理中之意，而加血分藥，兼理其下，亦可取用。此方即用附子理中湯，更加香燥之藥以強其胃，胃氣虛寒者，亦可暫用一二劑也。