

非類固醇抗發炎藥物(NSAIDs)

COX-1：傳統 NSAIDs 藥物

Anaprox(Naproxen) 250mg/tab 安納百鎮錠

Cataflam(Diclofenac) 25mg/tab 克他服寧錠

Grofenac(Diclofenac) 100mg/tab 克伏炎持續錠

Indoy(Indomethacin) 25mg/cap 炎達益膠囊

Nifluril(Niflumic) 250mg/tab 乃富利膠囊

Ponstan(Mefenamic) 250mg/tab 博疏痛膠囊

Relifex(Nabumetone) 500mg/tab 美伏疼錠

Surgem(Tiaprofenic) 200mg/tab 司健錠

Tilcotil(Tenoxicam) 20mg/tab 定得樂錠

Weisu(Sulindac) 200mg/tab 衛舒膜衣錠

COX-2：新一代 NSAIDs 藥物

Celebrex(Celecoxib) 100mg/tab 希樂葆膠囊

Lonin(Etodolac) 200mg/cap 勞寧膠囊

Mobic(Meloxicam) 7.5mg/tab 骨敏捷錠

Nimed(Nimesulide) 100mg/tab 妮媚錠

Vioxx(Rofecoxib) 12.5mg/tab 偉克適錠

■ 藥品效用

具有消炎、止痛作用。

■ 服用指示

1. 請按照醫師指示服藥。
2. 忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。

■ 注意事項

1. 孕婦或授乳婦女請告知您的醫師或藥師。
2. 若有消化性潰瘍、嚴重血液異常、嚴重肝腎功能障礙，請先告知醫師或藥師。
3. 若對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。

■ 副作用

1. 若有輕微胃腸不適，可於飯後立即服用來避免；若症狀有加重或持續並有解黑便，請立即停藥並告知醫師。
2. 偶而會有腹瀉、便秘或口腔潰瘍。