

凝血性疾病病患牙科就醫應注意的事項：

[返回 醫療衛教](#)

發表醫師

發佈日期 2010/02/18

凝血性疾病病患

血小板過少症

酒精誘發血小板過少症，血拴性血小板過少紫班症

骨髓功能衰竭：維生素 B12 或葉酸缺乏、白血病、肝硬化、
門脈高血壓

血小板病變

aspirin 0.3g-1.5g，會影響血小板功能 7 到 10 天，有些 NSAID
也會影響血小板功能

尿毒症：腎臟衰竭所產生的尿毒會抑制血小板功能

凝血因子異常

血友病: von Willebrand' s Disease:

後天凝血異常

肝病：因為肝臟無法正常合成維生素 K

服抗凝劑：coumarin 抑制維生素 K，Heparin 治療：靜脈注射
抑制血拴，維生素 K 缺乏症

凝血性疾病病患牙科就醫應注意的事項：

病患牙科處置手術易流血，提醒醫師注意，提高警覺

署立雙和醫院牙科部關心您的健康

聯絡電話(02)2249-0088 分機 2554~2556

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。