

※嘔吐噦下利病脈證并治^{第十七 410}

趺陽脈浮而濇，浮則為虛，虛則傷脾。脾傷則不磨，

朝食暮吐，暮食朝吐，宿穀不化，名曰胃反。脈緊而

濇，其病難治。

〔按〕：

虛則傷脾之「虛」字，當是「濇」字，是傳寫之訛。

〔註〕：

前條因誤下而病胃反，則脈弦；此條不因誤下而病胃反，則脈浮而濇也。趺陽脈見浮而濇，浮以候胃，濇以候脾；浮而無力為胃虛，濇而無力為傷脾；胃虛脾傷，則不能消磨水穀，故朝食暮吐，暮食朝吐，所吐皆仍然不化之宿穀，故曰胃反也。若脈緊濇，則為邪盛正衰，故其病難治也。

〔集註〕：

徐彬曰：緊為寒盛，濇為液竭，正不勝邪，故曰：難治。

※嘔吐噦下利病脈證并治^{第十七 411}

胃反嘔吐者，大半夏湯主之。

〔註〕：

此承上條以明其治也。胃反嘔吐者，謂朝食暮吐，暮食朝吐之嘔吐也。主之大半夏湯者，補脾胃，止嘔吐也。

※嘔吐噦下利病脈證并治^{第十七 412}

大半夏湯方：半夏 二升，洗浣用 人參 三兩 白蜜 一升

上三味，以水一斗二升，和蜜揚之二百四十遍，煮藥取一升半，溫服一升，餘分再服。

千金方云：大半夏湯治胃反不受食，食入即吐。外臺方云：大半夏湯治嘔，心下痞硬者。

〔集註〕：

高世栻曰：朝食暮吐，宿穀不化，名曰胃反。胃反但吐不嘔，然吐不離乎嘔，故曰：胃反嘔吐者。用半夏助燥氣以消穀，人參補元氣以安胃，白蜜入水揚之，使甘味散於水中，水得蜜而和緩，蜜得水而淡滲，庶胃反平而嘔吐愈。

李升璽曰：嘔家不宜甘味，此用白蜜何也？不知此胃反自屬脾虛，經所謂甘味入脾，歸其所喜是也。況君以半夏，味辛而止嘔，佐以人參溫氣而補中，胃反自立止矣。

嘔吐噦下利病脈證并治_{第十七 413}

胃反，吐而渴欲飲水者，茯苓澤瀉湯主之。

〔註〕：

胃反吐而不渴者，寒也；渴欲飲水者，飲也，故以茯苓澤瀉湯，補陽利水也。

※嘔吐噦下利病脈證并治_{第十七 414}

茯苓澤瀉湯方：

茯苓_{半斤} 澤瀉_{四兩} 甘草_{二兩} 桂枝_{二兩} 白朮_{三兩} 生薑_{四兩}

上六味，以水一斗，煮取三升，內澤瀉，再煮取二升半，溫服八合，日三服。

外臺方云：茯苓澤瀉湯，治消渴、胃反、脈絕。

〔集註〕：

李杲曰：吐而渴者，津液亡而胃虛燥也。飲水則水停心下，茯苓、

澤瀉，降氣行飲，白朮補脾生津，此五苓散原方之義也。然胃反因脾氣虛逆，故加生薑散逆，甘草和脾，又五苓散治外有微熱，故用桂枝。此胃反無表熱，而亦用之者，桂枝非一於攻表藥也，乃徹上徹下，達表裏為通行津液，和陽散水之劑也。

尤怡曰：茯苓澤瀉湯，治吐未已，而渴欲飲水者，以吐未已，知邪未去，則宜桂枝、甘薑散邪氣，茯苓、澤瀉消水氣也。

※嘔吐噦下利病脈證并治_{第十七 415}

噦逆者，橘皮竹茹湯主之。

〔註〕：

噦即乾嘔也。因其有噦噦之聲，而無他物，故不曰乾嘔，而曰噦逆，屬氣上逆為病也。上逆之氣，得出上竅，皆能作聲，故肺虛氣上逆，則作欬，氣從喉出而有欬逆之聲，若為邪所阻，則為喘滿，故無聲也。胃虛氣上逆，則作噦，氣從咽出而有噦逆之聲。若與物凝結，則為痞痛，故無聲也。是知氣病也明矣。然邪氣所湊，正氣必虛，故用橘皮、竹茹、生薑以清邪氣，人參、甘草、大棗以補正氣，則上逆之氣自可順矣。

※嘔吐噦下利病脈證并治_{第十七 416}

橘皮竹茹湯方：

橘皮 二斤 竹茹 二升 大棗 三十枚 生薑 半斤 甘草 五兩 人參 一兩

上六味，以水一斗，煮取三升，溫服一升，日三服。

〔集解〕：

李杲曰：噦有屬胃寒者，有屬胃熱者，此噦逆因胃中虛熱，氣逆所致。故用人參、甘草、大棗補虛，橘皮、生薑散逆，竹茹甘寒，疏逆氣而清胃熱，因以為君。

尤怡曰：胃虛而熱乘之，則作噦逆，橘皮、生薑和胃散逆，竹茹除熱止嘔噦，人參、甘草、大棗益虛安中也。