

※婦科心法要訣產後門-方劑 16

不語證治 加味八珍湯 星連二陳湯 七珍散

產後不語分虛實，痰熱乘心敗血衝，氣血兩虛神鬱

胃，實少虛多要辨明，虛用八珍藤菖志，痰熱星連入

二陳，敗血衝心七珍散，芎地辛防硃蒲參。

〔註〕：

產後不語須分虛實治之：有痰熱乘心者，有敗血衝心者，有氣血兩虛而鬱冒神昏者。大抵產後屬虛者多，而實者少也。

1. 虛宜，八珍湯加鈎藤、菖蒲、遠志。

2. 痰熱，宜二陳湯加膽星、黃連。

3. 敗血沖心，宜七珍散。即川芎、生地、細辛、防風、硃砂、菖蒲、人參也。

《八珍湯方見首卷。二陳湯方見三卷》

※婦科心法要訣產後門-方劑 17

驚悸恍惚證治 茯神散 加味歸脾湯

產後血虛心氣弱，驚悸恍惚不安寧，養心須用茯神

散，參耆地芍桂茯神，琥珀龍齒歸牛膝，憂思歸脾砂

齒靈。

〔註〕：

產後血虛，心氣不守，神志怯弱，故令驚悸恍惚不寧也。宜用茯神散。其方乃人參、黃耆、熟地、白芍、桂心、茯神、琥珀、龍齒、當歸、

牛膝也。

若因憂愁思慮傷心脾者，宜歸脾湯加硃砂、龍齒治之。

《歸脾湯方見首卷》

※婦科心法要訣產後門-方劑 18

妄言見鬼發狂證治 妙香散

產後譫狂見鬼神，敗血沖心小調經，心虛悶亂妙香

散，二茯參耆遠志辰，甘桔木麝山藥末，歸地煎調效

若神。

〔註〕：

產後敗血沖心，狂亂見鬼，譫言妄語者，宜服小調經散。

若因心血虛，神不守舍而悶亂者，則用妙香散。即茯苓、茯神、人參、黃耆、遠志、辰砂、甘草、桔梗、木香、麝香、山藥為散。以當歸、熟地、煎湯、調服即愈。其效如神。

※婦科心法要訣產後門-方劑 19

虛煩證治 人參當歸湯

產後血虛煩短氣，人參當歸湯最良，參麥歸芍熟地

桂，瘀血衝心失笑方，去血過多煩躁甚，須用當歸補

血湯。

〔註〕：

產後血虛心煩短氣者，宜人參當歸湯。即人參、麥冬、當歸、白芍、熟地、肉桂也。

若因敗血沖心者，宜服失笑散。

若去血過多煩而躁者，乃亡血證也。宜當歸補血湯。

《當歸補血湯、失笑散。方俱見首卷》

※婦科心法要訣產後門-方劑 20

發渴證治

參麥飲 加味四物湯 竹葉歸耆湯

氣上津短參麥飲，血虛四物粉麥煎，渴甚竹葉歸耆

效，參朮歸耆竹葉甘。

〔註〕：

產後氣虛津液不足而渴者，宜參麥飲。即人參、麥冬、五味子也。

血虛而渴者，宜四物湯加花粉、麥冬。

若渴甚不解者，用竹葉歸耆湯。其方乃人參、白朮、當歸、黃耆、竹葉、甘草、煎服也。

《四物湯方見首卷》