

<藥物效用>

肌肉鬆弛。

緩解肌肉疼痛。

<服藥指示>

1. 請按照醫師指示服藥。
2. 忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。

<注意事項>

1. 孕婦或授乳婦女請告知您的醫師或藥師。
2. 若對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。
3. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物（包含非處方藥），特別是抗組織胺的藥物。
4. 此藥品可能導致嗜睡，服藥後不宜開車或操作危險機械。
5. 酒精會加重的嗜睡作用，服用此藥期間請避免飲酒。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：頭暈、腸胃不適、噁心、手臂、腿、手和腳有刺痛感、口乾，肌肉痙攣增加，若情況未改善或惡化，請與醫師連絡。
2. 若上述症狀加重或出現以下情形，請立即與醫師聯絡：下巴、頸部、背部肌肉抽攣、說話遲緩、行動緩慢、持續性的顫抖、發燒、呼吸或吞嚥困難、嚴重的皮膚紅疹、眼睛或皮膚變黃。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。