

<藥物效用>

此藥是用來控制第二型糖尿病，使您的血糖在正常(接近正常)的範圍內。

<服藥指示>

- 1.糖尿病無法根治，但高血糖會引起腎臟，眼睛及心血管病變；故需要長期良好的控制，請按照醫師指示服藥，不可因為沒有不舒服的自覺症狀而自行停藥。
- 2.請於用餐前以少量液體整顆吞服，或用餐時於前數口和食物一起咬碎吞下。但若未用餐則不要服用。
- 3.若您於用餐中或剛用完餐想起尚未服藥，請馬上服用。否則就不要再服此次藥量，只需在下次用餐時服藥。不可一次服用兩次的藥量。
- 4.服藥期間請勿喝酒。

<注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳或有肝腎方面疾病，請告知您的醫(藥)師。
- 2.當感冒或發燒時，每日應監測血糖 3-4 次。但若有任何嚴重嘔吐或低血糖，應立刻聯絡醫師。
- 3.若有以下高血糖症狀：頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、身體虛弱、呼吸困難、心跳加快、皮膚乾燥、反應遲鈍，請立刻聯絡您的醫師。
- 4.若有以下低血糖症狀：不尋常的飢餓感、無力感、顫抖、心跳加快、冒冷汗、視力模糊、精神意志不易集中，應立刻補充果汁 200cc 或糖果 2-4 顆。高低血糖症狀有時不易分辨，可先測血糖再決定是否需要補充果汁或糖果。若常有高低血糖發生，請告知你的醫師、藥師或衛教師。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：噁心、腹瀉、消化不良、鼻塞、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛。這些症狀會隨時間慢慢減弱
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：體重快速增加、手腳腫脹。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。