

※辨太陽病脈證并治下篇-湯劑 7

茯苓四逆湯方

茯苓 六兩 人參 一兩 甘草 二兩，炙 乾薑 一兩半 附子 一枚，生用，

去皮，破八片。

上五味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服七合，日三服。

〔方解〕：

表裏之病，治不如法，先過汗，後復過下；或下後復汗，誤而又誤，變成壞病。若其人陽盛而從熱化，則轉屬三陽；陽衰而從寒化，則繫在三陰。此二條煩躁皆壞病也。

煩躁雖六經俱有，而多見於太陽、少陰者，太陽為真陰之標，少陰為真陽之本也。

未經汗下而煩躁，多屬陽，其脈實大，其證熱渴，是煩為陽盛，躁為陰虛。已經汗下而煩躁，多屬陰，其脈沈微，其證汗厥，是煩為陽虛，躁為陰盛也。

夫先下、後汗，於法為逆，外無大熱，內不嘔渴，似乎陰陽自和，而實陽虛陰盛。所以虛陽擾亂於陽分，故晝日煩躁，不得眠；盛陰獨治於陰分，故夜而安靜；脈沈微，是真陽將脫而煩躁也。用乾薑、附子，壯陽以配陰。薑、附者，陽中陽也，生用則力更銳，不加甘草，則勢更猛，比之四逆為更峻，救其相離，故當急也。

先汗、後下，於法為順，病仍不解，遽增晝夜煩躁，亦是陰盛格陽之煩躁也，用茯苓四逆湯，抑陰以回陽。茯苓感太和之氣化，伐水邪而不傷陽，故以為君；人參生氣於烏有之鄉，通血脈於欲絕之際，故以為佐；人參得薑、附，補氣兼以益火；薑、附得茯苓，補陽兼以瀉陰；調以甘草，比之四逆為稍緩，和其相格故宜緩也。一去甘草，一加參、苓，而緩急自別，仲景用方之妙如此。