

<藥物效用>

- 1.帕金森氏症用藥
- 2.治療因其他藥物引起的副作用

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，請勿擅自停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.服用此藥期間，請避免喝酒。
- 4.服用此藥期間，請避免嚼檳榔。

<注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥品。其中特別要注意的有：安眠藥、憂鬱症用藥、鎮靜劑、感冒藥、抗過敏藥等。
- 4.若您有狹角性青光眼、胃腸道狹窄、巨結腸炎、重症肌無力、癲癇、心臟疾病、前列腺肥大，請告知您的醫(藥)師。
- 5.另外其有導致眩暈及嗜睡的副作用，服用時避免從事需要集中注意力的事如開車或操縱機械。
- 6.服用此藥可能會減少流汗，請避免劇烈運動或待在炎熱的地方。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：口乾、皮膚乾燥、輕微視力模糊的情形，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：過敏反應、幻覺、癲癇、眼睛畏光、無法控制的肌肉運動、食慾減低、體重減輕、排尿困難。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。

