

※辨太陽病脈證并治中篇-條文 32

太陽病，脈浮緊、發熱、身無汗，自衄者，愈。

〔註〕：

太陽病，脈浮緊，發熱無汗，此傷寒脈證也，當發其汗。若當汗不汗，則為失汗，失汗則寒閉於衛，熱鬱於榮，初若不從衛分汗出而解，久則必從榮分衄血而愈也。故太陽病，凡從外解者，惟汗與衄二者而已。今既失汗於榮，則榮中血熱妄行，自衄，熱隨衄解，必自愈矣。

〔集註〕：

方有執曰：此承上條，復以其證之較輕者言，以見亦有不治而自愈者，所以曉人勿妄治以致誤之意。太陽病，脈浮緊，發熱身無汗，與上條同，而無疼痛，則比之上條較輕可知矣。所以不待攻治，得衄自愈也。汗本血之液，北人謂衄為紅汗，即此說也。

程知曰：言得衄雖無汗，必自愈也。人之傷於寒而為熱者，得衄發越，故愈。

張璐曰：衄血成流，則邪熱隨血而散，有血則無汗也。設不自衄，當以麻黃湯發之，發之而邪解，則不衄矣，發之而餘邪未盡，必仍衄而解。

※辨太陽病脈證并治中篇-條文 33

傷寒，脈浮緊，不發汗，因致衄者，麻黃湯主之。

〔註〕：

此承上條以出其治也。傷寒，脈浮緊，法當發汗，若不發汗是失汗也，失汗則熱鬱於榮，因而致衄者，宜麻黃湯主之。若能於未衄之先，早用麻黃湯汗之，汗出則解，必不致衄，其或如上條之自衄而解，亦無須乎藥也。

〔按〕：

凡傷寒初起，但不甚惡寒，便知夾熱後多得衄。其熱多、寒少者，則熱隨衄去，繼而汗出，表與熱均解也。其熱少、寒多者，縱熱隨衄去，繼必不汗出，表仍未解，誠能用青龍、麻黃湯於未衄之先發之，則汗、衄兩解矣。若已經衄後，而汗不出，表不解，即用麻、桂之藥，以和榮

衛，亦須少兼芩、連、犀、地，清陰涼血之品佐之，以護及陰血可也。

然大衄之後，麻黃、青龍不可輕用。若用之不當，則犯衄家不可汗之戒矣。

〔集註〕：

活人書云：衄後脈浮者，宜麻黃湯；衄後，脈微者，不可行麻黃湯，宜黃芩芍藥湯。蓋衄後脈浮，表未解也；脈微，表已解也。於此見仲景用麻黃湯於衄後之大旨。

方有執曰：傷寒，脈浮緊者，寒多風少之謂也。上二條皆風多寒少。前條以服藥已微除，汗發不透而致衄。上條以較輕得自衄，此以寒多不發汗而致衄，三條之所以辨差分也。蓋寒多則於法當發汗，而不發汗，熱鬱血亂，所以衄也。衄則陽邪之風散。麻黃湯者，發其尚未散之寒也。

程知曰：此言寒邪不發之衄，仍宜溫散也。不發汗而致衄，是入榮之寒，不得泄越而然也。寒不盡則衄不止，故仍用麻黃，不必待其衄也。此與上條有寒熱之別。

程應旄曰：大抵傷寒見衄者，由其榮分素熱，一被寒閉，榮不受遏，從而上升矣。

※辨太陽病脈證并治中篇-條文 34

傷寒不大便六、七日，頭痛有熱者，與承氣湯。其

小便清者，知不在裏，仍在表也，當須發汗。若頭痛

者，必衄，宜桂枝湯。

〔按〕：

若頭痛之「若」字，當是「苦」字，苦頭痛方為必衄之證。若是「若」字，則凡頭痛皆能致衄矣。

〔註〕：

傷寒不大便六、七日，裏已實，似可下也；頭痛、熱未已，表未罷，可汗也。然欲下則有頭痛發熱之表，欲汗則有不大便之裏，值此兩難之時，惟當以小便辨之。其小便渾赤，是熱已在裏，即有頭痛發熱之表，亦屬裏熱，與承氣湯下之可也；若小便清白，是熱尚在表也，即有不大便之裏，仍屬表邪，宜以桂枝湯解之。

然傷寒頭痛不論表裏，若苦頭痛者，是熱劇於榮，故必作衄，則榮

熱解矣。方其未衄之時，無汗宜麻黃湯，有汗宜桂枝湯汗之，則不衄而解矣。

〔集註〕：

汪琥曰：頭痛不已者，為風寒之邪上壅，熱甚於經，勢必致衄，須乘其未衄之時，酌用麻黃湯或桂枝湯以汗解之，而驗小便，實為仲景妙法。

魏荔彤曰：此條之衄，乃意料之辭，非已見之證也。

※辨太陽病脈證并治中篇-條文 35

太陽病不解，熱結膀胱，其人如狂，血自下，下者

愈。其外不解者，尚未可攻，當先解其外；外解已，

但少腹急結者，乃可攻之，宜桃核承氣湯。

〔註〕：

太陽病不解，當傳陽明，若不傳陽明而邪熱隨經，瘀於膀胱榮分，則其人必如狂。如狂者，瘀熱內結，心為所擾，有似於狂也。當此之時，血若自下，下者自愈；若不自下，或下而未盡，則熱與瘀血，下蓄膀胱，必少腹急結也。設外證不解者，尚未可攻，當先以麻黃湯解外。外解已，但少腹急結痛者，乃可攻之，宜桃核承氣湯，即調胃承氣加桃核，所以攻熱逐血也。蓋邪隨太陽經來，故又加桂枝以解外而通榮也。先食服者，謂空腹則藥力下行捷也。

〔按〕：

太陽病不解，不傳陽明，邪熱隨經入裏，謂之犯本。犯本者，謂犯膀胱之府也。膀胱府之衛為氣分，膀胱府之榮為血分。熱入而犯氣分，氣化不行，熱與水結者，謂之犯衛分之裏，五苓散證也；熱入而犯血分，血蓄不行，熱與血結者，謂之犯榮分之裏，桃核承氣湯證也。二者雖皆為犯本之證，二方雖皆治犯本之藥，而一從前利，一從後攻，水與血，主治各不同也。

〔集註〕：

喻昌曰：桃核承氣湯用桂枝解外，與大柴胡湯解外相似，益見太陽隨經之熱，非桂枝不解也。

程知曰：太陽病不解，隨經入府，故熱結膀胱。其人如狂者，瘀熱

內結，心不安寧，有似於狂也。若血自下，下則熱隨瘀解矣。然必外證已解，乃可直攻少腹急結之邪。於調胃承氣中加桃核者，欲其直達血所也；加桂枝以通血脈，兼以解太陽隨經之邪耳。

汪琥曰：膀胱乃小腹中之物。膀胱熱結，在衛則尿不利，在榮則血不流，故作急結之形，為下焦畜血之證諦也。所以用桃核承氣湯，乃攻下焦畜血，治少腹急結之藥，實非通膀胱熱結之藥也。