

傷科大成

接骨入骱用手巧法-依病因分類

原文

失枕有因臥者，有一時之誤者，使患者坐低處，先行揉摩，一手提起其頭，一手托住其下頰，緩緩轉動伸舒使直，服吉利散。

凡傷過重，大便不通者，用牙皂末蜜丸如青果大，插入肛門內即通。

戳傷五內或大腸者，不治。傷口淺直者，易治。血出不止，服止血定痛散。傷口深斜者，待流血止，搽金瘡藥，服護風托裡散。

凡碰擦磕跌，並刀砍斧斫，肉開血流，或皮微破者，傷不過重，人每不甚介意。惟在春最易侵風。在頭為重，別處稍輕，漸見浮腫，速進玉真散，避風為要。若不急治，成破傷風，甚至青腫，牙關緊閉，神昏發狂，角弓反張，四肢抽搐，多致不救。玉真散天麻八分 羌活六分 防風 白附子 川芎 白芷各一錢煎服刀斧砍傷硬處者，骨損先療骨。砍傷軟處者，肉損先治肉。如傷頭額者，敷金瘡藥，以避風為上，防身發寒熱。脈沉細者，易治；脈洪大者，難醫。

以刀刎喉，左手執刀者斜而深，右手執刀者直而淺。刎一刀者深而難治，刎兩刀者淺而易療。如喉管斷，有出入之氣，摻藥吸進必噎咳，急以雞蛋內衣蓋管上，再摻藥則不噎。如或破半邊，或全斷，急以油線縫合其口。若血不止，用滑石、五倍研末摻之，外封金瘡藥，貼膏藥。長五寸、闊三寸，加布條扎項，高枕仰臥，使項屈而不伸，刀口易合。三日后，以蔥湯洗去前藥，摻生肌散，貼膏藥，仍舊扎好。兩月余完全，服護風散。如發寒熱進補中益氣湯，若氣管斷或稍穿破者，不治。

傷破肚皮，而腸拖出者，醫者先自剪去指甲，免碰傷其腸，將溫水和麻油，浴暖外出之腸，輕輕揉進。若未能進，用醋和冷水，勿令患者知，忽噴其面，其腸自收。以油線淺淺縫其口，太深則傷內肉，封金瘡藥，貼活雞皮，加布扎好，服通腸活血湯。五內不傷，飲食如常者，不妨。腸突出膜外者不治。如腸未出，而膜已穿，血向內流者不治。桑根皮搓線尤妙。骨碎如粟米者，輕輕箝去其碎骨，封金瘡藥，服生血補髓丹。如骨脫臼，捏平其骨合筭，貼損傷膏，服壯筋續骨丹。

從高墜跌骨碎者，或骨脫骱者，以手輕輕捏骨與骱平

伏，敷定痛散，外護金瘡藥，投疏風理氣湯，次以補中益氣湯。如頸項跌入腔內，尚活動，掉于左右，治以提法。頭低不起，治以正法。頭頂歪斜，治以整法。面仰頭不能低，或筋長骨錯，或筋聚筋強，治以推正接整法。能起坐行動者輕，昏迷不語，痛極硬腫者重。

登高墜斷肋骨者，以手拿骨平伏，貼損傷膏，加布扎好，服接骨散。如食飽墜傷腸斷者捏破陰囊，卵子拖出者，浴以溫湯，輕輕拈進，貼以活雞皮，先搽金瘡藥，投吉利散。

卵子碎者不治。

捏傷陽物，小便不通者，急投琥珀丸。小便通者，進吉利散。踢傷肛門腫脹者，投通腸活血湯。大便不通者，以大黃湯。有紫血者，與吉利散。有鮮血者，進槐花散。火燒湯燙炮打各傷者，不能飲食者，火毒入五內時，想飲冷水，急以清心去毒飲。能飲食者，火毒未入內；傷破皮肉者，外敷琥珀膏，投去毒散。

剝落耳鼻者，急趁血熱蘸發灰末貼于原位，不可歪斜，外加夾縛法。或斬斷手臂，或手腿膀，或足指，急將斷下者，趁血未冷，湊接齊整合攏，搽止血丹外，敷金瘡藥，服托裡止痛散。如血已冷，湊接不得粘合，遂成殘缺之體。

橋梁牆垣倒壓，折傷骨節，傷頭顱骨碎者，箝去碎骨收口，方無后患。防染破傷風，服托裡散，次以接骨散。傷兩太陽昏迷不醒，飲食不入，言語不出者，不治。腦漿出者不治。

傷胸前背后，及五臟者，雖不言不食，殆氣悶于中，投吉利散。身發寒熱，以疏風理氣湯。

傷兩邊軟肋者，飲食如故，服吉利散。傷腰子過重者不治。輕者貼損傷膏，服補腎和血湯。

踢傷小腹者，傷處作痛，小便閉塞，不能行步，三日可治。內有瘀血，以行氣活血湯。

孕婦小腹受足踢者不治。

受傷紫腫痛難忍者，以活血止痛湯，次服吉利散。腫而青紫或發寒熱，或二便閉，氣悶，坐臥不安，不進飲食，卵子不時上下，此瘀血在內。先以疏風理氣湯，次投琥珀丸。如紅腫陣陣作痛，氣喘發咳，欲笑溺澀，投活血止痛湯。

踢傷海底穴者，腫而紅紫，痛不可忍，貼損傷膏，服活血止痛湯，次以吉利散。腫而青，身發寒熱，小便不通，氣悶腹痛，陰子或上或下，內有瘀血，貼損傷膏，以行氣活血湯，次進琥珀丸。肛門腫痛二便不通者，發熱食少，坐臥不

安。服疏風順氣湯，次投琥珀丸。紅腫不消，陣陣作痛，氣喘發咳，或笑或哭，小便澀滯。先以活血止痛湯，次進吉利散，后服藥酒而愈。如初受傷昏迷不語者，口出唾涎，喉鼻喘息，面白胸腹氣動，脈沉細者可治。先吹牙皂末鼻中取嚏，次以砂仁泡湯，煎吉利散，再投活血止痛湯，貼損傷膏。

刀斧傷者為金瘡，淡黃色者易治，紫黑色者難治，忌咳嗽嘔噦，避風為妙。如風入傷口浮腫多涕淚，痰涌牙關緊閉，角弓反張，成破傷風者不治。急以壁喜窩香灰加麝香敷傷處，投疏風理氣湯。如犯怒氣瘡迸裂，犯欲瘡口腐臭，用乳香、沒藥、滴乳石、血竭為末敷之。

患者當避風寒，戒色忍氣，息怒散心，節飲食，忌食（雞、鵝、醋、蛋、牛羊肉、筍、面，煎炒發物）。

許真人曰：人受刀斧所傷，血出多者必渴，不可與水飲。如飲熱湯，則血沸，血沸出必忌惱怒，二忌喜笑，三忌大言，四忌勞力，五忌妄想，六忌食羹粥，七忌飲酒，八忌酸咸。前有別症而受傷在后者，兩兼而用藥。

孕婦當服安胎順氣藥。

受杖后者，腿必紫黑，甚者氣悶攻心而死，速服酒沖童便，外用熱豆腐敷之，其腐即紫，頻換豆腐，至色淡為度。

或搗熱蔥熨之。或用大黃末童便和敷，內服化瘀藥。

受夾棍后者，急用熱童便一盆浸之。如童便冷，燒熱磚淬之則熱。浸至童便面起白油者方止。外搗肥皂和雞子清敷之，加布扎緊。或搗何首烏敷之，內服逐瘀定痛藥。

註釋

骹：骨之小筍也。