

※婦科心法要訣經閉門-方劑 1

血滯經閉證治 三和湯

石瘕帶表吳茱萸，攻裏琥珀散最宜，胞閉三和湯四

物，硝黃連薄草芩梔。

〔註〕：

寒氣客於胞中，血留不行而成石瘕。

1. 兼表證多者，宜吳茱萸湯溫散之。

2. 裏證多者，宜琥珀散攻之。

3. 胞脈閉上迫於肺，心氣不得下通，故月事不來，宜三和湯清之。即四物湯合涼膈散。乃朴硝、大黃、連翹、薄荷、甘草、梔子、黃芩也。如大便不實者，去硝黃。

吳茱萸湯、琥珀散、四物湯。《方俱見前調經門》

※婦科心法要訣經閉門-方劑 2

血枯血虧經閉證治 六味地黃湯

胃熱燂血玉燭散，失血血枯養榮湯，地黃湯治房勞

損，萸藥苓丹澤地良，乳眾血枯熱若閉，須用十全大

補方。

〔註〕：

經曰：二陽之病發心脾，女子不月二陽胃也。胃熱甚則燂其血，血海乾枯，故月事不下，宜以玉燭散泄其胃熱，則經血自行。

若因素有吐衄之證，或生育過多，則血海乾枯。及房勞過傷陰血，乳眾傷其血液，皆足以致經閉。

1. 失血多者，宜養榮湯主之。

2. 房勞過者，以六味地黃湯滋之。即山萸、山藥、白茯苓、丹皮、

澤瀉、熟地黃也。

3. 乳眾者，以十全大補湯培補之。

《玉燭散、養榮湯、十全大補湯。方俱見前調經門》

※婦科心法要訣經閉門-方劑 3

經閉久嗽成勞證治 劫勞散

月水不行蒸潮汗，食減咳嗽血風勞，劫勞散用參苓

芍，歸地甘耆半味膠。

〔註〕：

經閉久嗽，又見骨蒸潮熱，盜汗自汗，飲食減少之證，則為之血風勞，宜用劫勞散。即人參、茯苓、白朮、當歸、生地、甘草、黃耆、半夏、五味子、阿膠也。

※婦科心法要訣經閉門-方劑 4

婦人經斷復來 芩心丸 益陰煎

經斷復來血熱甚，芩心醋丸溫酒吞，益陰知藥龜生

地，縮砂炙草棗薑尋，血多熱去傷衝任，十全大補與

八珍，暴怒憂思肝脾損，逍遙歸脾二藥斟。

〔註〕：

婦人七七四十九歲後，天癸不行。若止而復來，無他證者，乃血有餘，不得用藥止之。

1. 若因血熱者，宜芩心丸。用黃芩心末二兩，醋丸溫酒送下。或用益陰煎。即知母、黃蘗、龜板、生地、縮砂、炙草也。

2. 若血去過多，熱隨血去，衝任虛損，其血不固者，宜十全大補湯

、八珍湯。

3. 若因怒氣傷肝，肝不藏血。憂思傷脾，脾不攝血者。宜於逍遙散、歸脾湯二方，斟酌用之。

《十全大補湯、八珍湯、逍遙散、歸脾湯。方俱見前調經門》

※婦科心法要訣經閉門-方劑 5

室女師尼寡婦經閉證治 大黃蟪蟲丸 澤蘭葉湯 柏子仁丸

室女經閉多血結，大黃蟪蟲桃杏仁，虵蛭蟻螬甘草

芍，乾漆生地及黃芩，不足澤蘭歸草芍，柏子仁丸用

柏仁，熟地澤蘭牛卷續，相兼久服自然行，師尼寡婦

逍遙散，附蘭丹地鬱梔芩。

〔註〕：

室女經閉，多有氣血凝結者，宜用大黃蟪蟲丸。破血行氣，其經自通。方用大黃、蟪蟲、桃仁、杏仁、虵蟲、水蛭、蟻螬、甘草、白芍、乾漆、生地、黃芩。蜜丸服。

若其人虛弱，不任攻下，則用澤蘭葉湯。即澤蘭葉、當歸、甘草、白芍也。兼服柏子仁丸。方用柏子仁、熟地、澤蘭葉、牛膝、卷柏、續斷，丸，服煎丸。並進久久，其血自行。

至於師尼寡婦經閉之證，多屬鬱熱。宜用逍遙散，加香附、澤蘭葉、丹皮、生地、鬱金、黑梔、黃芩。以和肝理脾，清心開鬱，其經自通也。《逍遙散方見前調經門》