

※胸痺心痛短氣病脈證并治 第九 167

茯苓杏仁甘草湯方：茯苓 三兩 杏仁 五十個 甘草 一兩。

上三味，以水一斗，煮取五升，溫服一升，日三服，不差更服。

橘皮枳實生薑湯方：橘皮 一觔 枳實 三兩 生薑 半觔。

上三味，以水五升，煎取二升，分溫再服。

※胸痺心痛短氣病脈證并治 第九 168

胸痺，心中痞氣，氣結在胸，胸滿，脅下逆搶心，

枳實薤白桂枝湯主之，人參湯亦主之。

〔註〕：

心中，即心下也。胸痺病，心下痞氣，悶而不通者虛也。若不在心下，而氣結在胸，胸滿連脅下，氣逆撞心者實也。實者，用枳實薤白桂枝湯主之，倍用枳、朴者，是以破氣降逆為主也。虛者，用人參湯主之，即理中湯，是以溫中補氣為主也。由此可知痛有補法，塞因塞用之義也。

〔集註〕：

魏荔彤曰：胸痺，自是陽微陰盛矣。心中痞氣，氣結在胸，正胸痺之病狀也。再連脅下之氣，俱逆而搶心，則痰飲水氣，俱乘陰寒之邪，動而上逆，胸胃之陽氣，全難支拒矣。故用枳實薤白桂枝湯，行陽開鬱，溫中降氣。猶必先後煮治，以融和其氣味，俾緩緩蕩除其結聚之邪也。再或虛寒已甚，無敢恣為開破者，故人參湯亦主之，以溫補其陽，使正氣旺而邪氣自消也。

尤怡曰：心中痞氣，氣痺而成痞也，脅下逆搶心，氣逆不降，將為中之害也。用此二方者，一以去邪之實，即以安正；一以養陽之虛，即以逐陰，是在審其病之新久，與氣之虛實而決之。