

<藥物效用>

治療痛風、痛風性關節炎、高尿酸症

<服藥指示>

- 1.請按照醫師指示服藥。
2. 本藥可在飯後服用以減輕胃腸道刺激降低胃腸不適感
3. 為預防結石的產生，除非醫師另有指示，請儘可能多飲用開水
4. 忘記服藥請儘快服用，若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥，不可一次服兩次藥量。

<注意事項>

- 1.孕婦或授乳婦女不建議使用此藥，若有需要請告知您的醫師或藥師。
- 2.若對此藥有過敏現象，請停止服用並告知您的醫師或藥師。
- 3.本藥不適用於急性痛風發作。
- 4.若有鬱血性心臟病、糖尿病、高血壓、癲癇、肝病、癌症或腎臟病等病史者，請先告知醫師。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛或困倦，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.若上述症狀加重或出現以下情形，請立即與醫師聯絡：發燒、噁心及嘔吐並伴隨皮疹、皮膚紅腫刺癢或脫屑、結膜炎、口腔或生殖器潰瘍，應立即停止使用本藥品，並立即與醫師聯絡。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。