

<藥物效用>

此藥可治療圓盤狀及全身性紅斑性狼瘡、慢性風濕性關節炎、鎌狀瘧原蟲和間日瘧原蟲所引起的瘧疾。

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示服藥。
- 2.如果忘記服藥，請盡快服用；假如已接近下次服藥的時間，只要服用下次的用藥就好。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.可與食物或牛奶併服，以減低腸胃道之不適。

<注意事項>

- 1.若曾對此藥過敏者，請告知您的醫師或藥師。
- 2.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師
- 3.若您有(或曾經有)肝腎疾病、眼睛疾病、腸胃疾病，或服用其他藥物，請主動告知您的醫師。

<副作用>

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：噁心、嘔吐、腹瀉、食慾不振、腹痛、暈眩、頭痛、耳鳴，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.若上述症狀持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：視力障礙、畏光、皮膚發疹。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。