

如全身性狼瘡（systemic lupus erythematosus）自體免疫性疾病患者多半接受類固醇（steroid）的治療。如果病人只接受如牙體復形或是簡單的鑲復工作，可以當作正常病人處置，如果病人是要接受侵犯性的治療，如拔牙，口腔外科、牙周病手術，或大範圍之鑲復工作，就必須注意長期服用類固醇所造成腎上腺皮質功能不足的問題，治療前必須補充類固醇以補償腎上腺皮質功能不足。

**自體免疫疾病(全身性狼瘡)病患牙科就醫應注意事項：**

- 1.病人仍在服用類固醇，約診的當天服用雙倍類固醇劑量，第二天恢復正常劑量，手術前後盡量降低病人之焦慮。
- 2.停藥超過一年，可以認腎上腺皮質功能恢復正常
- 3.停藥時間未超過一年，我們可用 hydrocortisone 60mg，在手術當天、術後第一天、術後第二天給藥，術後第三、四天降低藥量至 40mg，術後第五、六天更降低至 20mg，然後在術後一周停藥。
- 4.手術前後盡量降低病人之焦慮。

聯絡電話(02)2249-0088 分機 2554~2556

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。