

※辨太陽病脈證并治中篇-湯劑 16

抵當湯方

水蛭 三十個，熬 虻蟲 三十個，熬去頭、足 大黃 三兩，去皮、破六片 桃核

二十個，去皮、尖。

上四味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升。不下者更服。

※辨太陽病脈證并治中篇-湯劑 17

抵當丸方

水蛭 二十個，熬 虻蟲 二十個，熬、去翅、足 桃核 二十五個，去皮尖 大黃

三兩。

上四味，搗篩為四丸，以水一升，煮一丸，取七合，服之，晬時當下血，若不下者，更服。

〔集解〕：

柯琴曰：膀胱為水府，血本無所容蓄者也。少腹者，膀胱之室也，熱結硬滿，當小便不利，而反利者，是病不在膀胱之內，而在少腹之內也。其隨經之榮血，因瘀熱結於少腹之裏，而非膀胱之裏也。所以小便雖利，而硬滿急結如故，是蓄血瘀於少腹也。熱淫於內，神魂不安，故發狂；血瘀不行，則榮不運，故脈微而沈；榮不運則氣不宣，故脈沈而結也；榮氣不周於身，則身黃。消穀善飢者，胃火熾盛也；大便反易者，血之濡也；色黑者，蓄血之化也。善忘者，血不榮智不明也。此皆瘀血之徵，非至峻之劑，不足以抵其巢穴，而當此重任，故立抵當湯。

蛭蟲之善飲血者，而利於水；虻蟲之善吮血者，而猛於陸，並取水陸之善取血者以攻之，同氣相求；更佐以桃核之苦溫，推陳致新；大黃之苦寒，蕩滌邪熱，故名抵當也。

若熱雖盛而未狂，少腹滿而未硬，則宜小其制為丸，以緩治之。若外證已解，少腹急結，其人如狂者，是又為轉屬陽明之證，用調胃承氣加桃核、桂枝之行血者於其中，以微利之，使胃和則愈矣，此桃核承氣

所以為治之緩也。

※辨太陽病脈證并治中篇-湯劑 18

大黃黃連瀉心湯方：大黃 二兩 黃連 一兩。

上二味，以麻沸湯二升漬之，須臾絞去滓，分溫再服。

〔方解〕：

痞硬虛邪，而用大黃、黃連，能不起後人之疑耶？然仲景使人疑處，正是使人解處，蓋因後人未能細玩，不得其法，竟煎而服之，大悖其旨矣。

觀其以滾沸如麻之湯，漬大黃、黃連，須臾絞去滓，僅得其無形之氣，不重其有形之味，是取其氣味俱薄，不大瀉下。雖曰攻痞，而用攻之妙，不可思議也。

※辨太陽病脈證并治中篇-湯劑 19

附子瀉心湯方

大黃 二兩 黃連 一兩 黃芩 一兩 附子 一枚，炮去皮，破、別煮取汁。

上四味，切三味，以麻沸湯二升漬之，，須臾絞去滓，內附子汁，分溫再服。