

是不是打了水痘疫苗就不會長水痘

[發表醫師] :王慈峰 醫師(家醫科)

[發布日期] :2006/1/20

水痘是由水痘疱疹病毒（**Varicella-zoster virus, VZV**）所引起的傳染性疾病，好發於十歲以下兒童，通常由飛沫傳染，也可經由直接觸病人皮膚的水泡而傳染。臨床上，初次感染水痘疱疹病毒引起水痘（**Varicella; chickenpox**），痊癒後病毒隱藏於感覺神經節內，其中 **10-15%**的人可能在日後再發造成帶狀泡疹(**Herpes Zoster**)，即俗稱的“皮蛇”。特別再年紀大或免疫力低下時。

水痘疫苗是一種活性減毒疫苗，一九七〇年代於日本發展出來。至一九九五年通過美國 **FDA** 認證，適用於一歲以上的幼童。一般健康的幼童，注射單一劑量的水痘疫苗後，有 **95 %** 以上可順利產生抗體，並可維持二十年以上的免疫力。目前建議劑量為：一歲以上、十三歲以下兒童注射一劑；十三歲以上兒童及成人應注射兩劑，間隔一個月。

5%兒童及 **10%**成人可能於注射後產生水痘樣的斑丘疹及紅斑；另外，**25%**的患者可能有局部反應：包括注射部位的紅、腫、疼痛。

和所有活性減毒疫苗一樣，水痘疫苗於懷孕期間不宜注射；成年女性注射後應至少避孕三個月。無水痘病史者，若於懷孕期間接觸到水痘患者，應於九十六小時內，注射水

痘帶狀疱疹免疫球蛋白(Varicella-zoster immune globulin,VZIG)。

此外對於水痘疫苗成分過敏者、罹患骨髓癌的兒童、免疫機能缺損的兒童及活動性肺結核患者都不建議施打。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。