

<藥物效用>

用來治療成人生殖器外部的疣和肛門周圍的疣溼性尖疣。

<服藥指示>

1.請您依照醫師指示的劑量使用。

2.使用方法：

(1)睡前，先將雙手洗淨，將乳膏擠於手指頭上，將乳膏薄塗於潔淨而乾爽的疣患表面，輕輕按摩，直至乳膏完全滲透。

(2)完成後請以性質溫和的肥皂和水清洗雙手。

(3)塗抹後六至十小時內，請勿洗澡；於六至十小時後，應以性質溫和的肥皂和清水潔淨患處。

3.若忘記塗抹乳膏，應在發現後立即將適量的乳膏塗於患處，並繼續原定之療程。在任何情況下，勿因忘記用藥而將份量加倍。

<注意事項>

1.請依照建議用量將乳膏薄塗於疣患表面，切勿過量使用。使用過量會引起皮膚嚴重的反應。因此應以性質溫和的肥皂和清水洗去多餘的乳膏。皮膚反應問題一經解決，便應繼續療程。

2.使用期間，應避免性接觸。

3.本藥膏可能減低保險套或子宮帽的避孕功效，故在性交時使用保險套或子宮帽，應在進行前把乳膏洗掉。

4.塗抹乳膏後，請勿以繃帶或其他敷料覆蓋疣患。

5.懷孕或以母乳餵哺嬰兒期間，應停止使用本乳膏。

6.避免陽光直射，宜保存於陰涼而乾爽之處，溫度保持在 25℃ 以下。但切勿冷凍。

7.請存放於兒童伸手不可觸及處。

<副作用>

1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：紅腫、皮膚磨損、皮膚脫屑或腫脹、皮下組織硬化、細小瘡患、治療時患處結痂、皮下出現小氣泡等。有時局部使用後會有發癢、灼熱與疼痛的感覺。大部分的皮膚反應屬溫和至中等，在停藥兩週後即可恢復正常。

2.上述皮膚反應若過於嚴重或感到極為不適，應以性質溫和的肥皂和清水洗去乳膏，並與醫師或藥師連絡。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。