

※嘔吐噦下利病脈證并治^{第十七 417}

乾嘔噦，若手足厥者，橘皮湯主之。

〔註〕：

乾嘔噦，猶言乾嘔，即噦也。東垣以乾嘔為輕，噦為重，識仲景措辭之意也。噦而手足厥，乃胃陽虛，是吳茱萸湯證也。若初病形氣俱實，雖手足厥，非陽虛陰盛者比，乃氣閉不達於四肢也，故單以橘皮通氣，生薑止噦也。

〔集註〕：

程林曰：乾嘔噦，則氣逆於胸膈間，而不行於四末，故手足為之厥。橘皮能降逆氣，生薑為嘔家聖藥，小劑以和之也。然乾嘔非反胃，厥非無陽，故下咽氣行即愈。

※嘔吐噦下利病脈證并治^{第十七 418}

橘皮湯方：橘皮^{四兩} 生薑^{半斤}

上二味，以水七升，煮取三升，溫服一升，下咽則愈。

※嘔吐噦下利病脈證并治^{第十七 419}

噦而腹滿，視其前後，知何部不利，利之即愈。

〔註〕：

噦虛邪也，噦而不腹滿者，為正氣虛。兼有熱者，以橘皮竹茹湯主之；兼有寒者，以吳茱萸湯主之。噦而腹滿者為邪氣實，當視其二便，大便不利者下之，小便不利者通之即愈也。

〔集註〕：

朱肱曰：前部不利豬苓湯，後部不利調胃承氣湯。

趙良曰：腹滿為實，實則氣上逆而作噦，故必視其前後何部不利而利之，則滿去而噦止。

魏荔彤曰：胃氣上逆，沖而為噦，治法當視其前後，審大小便調不調也。前部不利者，水邪之逆也，當利其小便而噦愈；後部不利者，熱邪實也，當利其大便而噦愈。

※嘔吐噦下利病脈證并治^{第十七 420}

夫六府氣絕於外者，手足寒，上氣腳縮；五藏氣絕

於內者，利不禁；下甚者，手足不仁。

〔註〕：

氣絕非謂脫絕，乃謂虛絕也。六府之氣，陽也，陽氣虛不溫於外，則手足寒縮。陽虛則陰盛上逆，故嘔吐噦也。五藏之氣，陰也，陰氣虛不固於中，則下利不禁，利甚則中脫形衰，故手足不仁也。此發明嘔吐、下利之原委也。

※嘔吐噦下利病脈證并治^{第十七 421}

下利清穀，裏寒外熱，汗出而厥者，通脈四逆湯主之。

〔註〕：

下利清穀，裏寒也。外熱汗出而厥，陽亡也。主之以通脈四逆湯，回陽勝寒，而利自止也。

※嘔吐噦下利病脈證并治^{第十七 422}

通脈四逆湯方：

附子 大者一枚，生用 乾薑 三兩，強人可四兩 甘草 二兩，炙

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分溫再服。