

※驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治 第十二 239

夫酒客欬者，必致吐血，此因極飲過度所致也。

〔註〕：

酒性大熱，潰脈傷經，極飲過度，必致欬嗽吐血也。

〔集註〕：

徐彬曰：此言吐血，不必由於不攝血，亦不必由於陰火熾盛。其有酒客而致欬，則肺傷已極，又為欬所擊動，必致吐血，故曰：極飲過度所致。則治之者，當以清酒熱為主也。

※驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治 第十二 240

亡血不可發其表，汗出則寒慄而振。

〔註〕：

凡失血之後，血氣未復，為亡血也，皆不可發汗。

失血之初，固屬陽熱，亡血之後，熱隨血去，熱雖消而氣逐血虛，陽亦微矣。若發其汗，則陽氣衰微，力不能支，故身寒慄而振振聳動也。

發陰虛之汗，汗出則亡陰，即發吐衄之汗也，故見不得眴，不得眠，亡陰之病也；發陽虛之汗，汗出則亡陽，即發亡血之汗也，故見寒慄而振，亡陽之病也。

〔集註〕：

李杲曰：奪血者無汗，以汗與血俱屬心液，血亡液竭，無復餘液作汗也。今又發表，則陰虛且更亡陽，表間衛氣虛極，故寒慄而振。

※驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治 第十二 241

吐血不止者，柏葉湯主之。

〔註〕：

吐血之病，熱傷陽絡，當清其熱；勞傷陽絡，當理其損。今以柏葉湯溫散之品，而治吐血不止者，則必是熱伏陰分，用此宣發，使熱行陽分，血不為熱所迫，則自止矣。

※驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治 第十二 242

柏葉湯方：柏葉、乾薑 各三兩 艾 三把。

上三味，以水五升，取馬通汁一升合煮，取一升，分溫再服。

〔集註〕：

程林曰：神農經云：柏葉主吐血，乾薑止唾血，艾葉止吐血。馬通者，白馬尿也。凡尿必達洞腸乃出，故曰通，亦微溫止吐血。四味皆辛溫行陽之品，使血歸經，遵行隧道，而血自止，故吐血不止，以柏葉湯主之也。

※驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治 第十二 243

心氣不足，吐血衄血，瀉心湯主之。

〔按〕：

心氣「不足」二字，當是「有餘」二字，若是不足，如何用此方治之，必是傳寫之訛。

〔註〕：

心氣有餘，熱盛也，熱盛而傷陽絡，迫血妄行，為吐、為衄。故以大黃、黃連、黃芩大苦大寒直瀉三焦之熱，熱去而吐衄自止矣。

※驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治 第十二 244

瀉心湯方：大黃 二兩 黃連、黃芩 各一兩。

上三味，以水三升，煮取一升，頓服之。